

# **NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO DELLE RAZZE AVICOLE AUTOCTONE**

## **CAPITOLO I – CRITERI DI AMMISSIONE AL LIBRO GENEALOGICO**

### **Art.1**

1. La valutazione morfologica dei soggetti ha la finalità di verificare la corrispondenza del soggetto esaminato allo standard della razza di appartenenza o a quella a cui si intende ascrivere.
2. La valutazione morfologica viene effettuata sui soggetti maschi e femmine dopo il raggiungimento della maturità morfologica e sessuale e comunque non prima dei 5 mesi di età. Può essere effettuata nel corso di appositi raduni o direttamente presso l'allevamento in cui i soggetti sono allevati, a condizione che l'allevamento sia iscritto al Libro Genealogico come allevamento nucleo o che abbia fatto domanda di aderire al Libro come allevamento nucleo.
3. La valutazione morfologica viene effettuata dall'esperto autorizzato ai sensi dell'art. 8 del disciplinare del Libro Genealogico, con le modalità e sulla modulistica stabilite dall'Ufficio Centrale.
4. L'esperto verifica il soggetto e la sua rispondenza allo standard di razza tenendo conto dei caratteri che comportano l'esclusione dei soggetti dal Libro Genealogico indicati nello standard di razza. Viene iscritto al Libro ogni soggetto che non presenti caratteri che ne comportino l'esclusione. La presenza di malformazioni evidenti comporta l'esclusione di un soggetto dal Libro Genealogico.
5. L'esperto riporta sulla scheda di valutazione morfologica il giudizio di corrispondenza allo standard di razza e, per i soggetti risultati non idonei alla valutazione, l'esperto riporta sulla scheda di valutazione solo il/i caratteri di esclusione la cui presenza comporta la non idoneità all'iscrizione al Libro Genealogico, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Centrale.

## **CAPITOLO II – IDENTIFICAZIONE SOGGETTI**

### **Art. 2**

1. L'identificazione dei riproduttori e dei soggetti iscritti o da iscrivere al Libro Genealogico viene effettuata mediante l'attribuzione di un codice alfanumerico, apposto con marchetta metallica all'ala destra e/o anello identificativo apposto al tarso destro dell'animale, entro i primi 15 giorni di vita.
2. Il codice alfanumerico riportato sulla marchetta alare e/o sull'anello del soggetto identificato costituisce l'unico identificativo valido per gli scopi del Libro Genealogico.
3. La composizione del codice alfanumerico così come le caratteristiche della marchetta alare e/o dell'anello sono definite dall'Ufficio Centrale. A discrezione dell'allevatore la marchetta può essere colorata.
4. E' cura dell'allevatore applicare la marchetta alare e/o l'anello agli animali da identificare ai fini dell'iscrizione al Libro Genealogico.

5. La perdita della marchetta alare e/o l'anello applicata all'animale, deve essere segnalata all'Ufficio Centrale o periferico e comporta l'applicazione di una seconda marchetta identificativa e/o anello avente un codice alfanumerico diverso dalla precedente.
6. E' consentito l'uso di anelli identificativi, anche colorati, da apporre al tarso del soggetto iscritto per le finalità gestionali dell'allevamento.
7. Per l'ammissione nei registri del Libro Genealogico dei soggetti presenti negli allevamenti di prima iscrizione, viene acquisito l'eventuale codice identificativo già riportato sui soggetti adulti presenti in allevamento per un massimo di 6 caratteri alfanumerici purché valutati idonei per l'iscrizione allo stesso Libro Genealogico.

### **CAPITOLO III – STANDARD DELLE RAZZE AUTOCTONE AMMESSE**

#### **Art.3**

1. Gli standard delle razze autoctone ammesse al libro genealogico delle razze avicole autoctone, sono di seguito riportate:

#### **Specie Pollo (Gallus gallus):**

1. **ANCONA;**
2. **BIANCA DI SALUZZO;**
3. **BIONDA PIEMONTESE;**
4. **COLLO NUDO ITALIANA (STANDARD N.D.);**
5. **ERMELLINATA DI ROVIGO;**
6. **LIVORNO;**
7. **MERICANEL DELLA BRIANZA;**
8. **MILLEFIORI LONIGO;**
9. **MILLEFIORI PIEMONTESE (STANDARD N.D.);**
10. **MODENESE;**
11. **MUGELLESE;**
12. **PADOVANA;**
13. **PEPOI;**
14. **POLLO TRENINO;**
15. **POLVERARA;**
16. **ROBUSTA LIONATA;**
17. **ROBUSTA MACULATA;**
18. **ROMAGNOLO;**
19. **VALDARNESE BIANCA;**
20. **VALDARNO (STANDARD N.D.);**
21. **SICILIANA;**
22. **TIROLESE O TIROLERHUHN;**
23. **VALPLATANI;**
24. **VAL D'ULTIMO O PROVES;**
25. **NOSTRANA DI MOROZZO;**
26. **CORNUTA DI CALTANISSETTA**

## 1. ANCONA

**AREA DI ORIGINE:** Italia Centrale

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Pollo mediterraneo, di tipo campagnolo, molto vivace e forte. Buona attitudine alla produzione di uova. Elevata rusticità, buona fertilità, buona resistenza alle malattie, ridotto ritmo di crescita.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio gallo alla maturità:** 2,2-2,5 kg.

**Peso medio gallina alla maturità:** 1,8-2,2 kg.

**Uovo:** Peso minimo 50 grammi. Colorazione guscio: bianco. Tasso di deposizione: 300 uova/anno

**Misura Anello:** Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.

### **CARATTERI TIPICI:**

**Testa:** leggermente allungata, di media grandezza.

**Becco:** forte e leggermente arcuato. Giallo con striature nere sulla parte superiore.

**Occhi:** grandi e sporgenti. Da arancio a rosso.

**Cresta:** semplice, rossa, ben sviluppata e diritta nel gallo. Cinque denti abbastanza profondi, regolarmente formati, larghi alla base, eccetto il primo gli altri sono di uguale altezza e larghezza, posizionati radiali all'occhio. Il lobo ben formato segue la linea della nuca senza avvicinarsi troppo. Nella gallina elegantemente ripiegata dopo il secondo dente.

**Bargigli:** rossi, mediamente grandi e allungati.

**Faccia:** rossa, liscia, di tessitura fine, senza piume e rugosità.

**Orecchioni:** di media grandezza, bianchi e a forma di mandorla. Lisci e ben aderenti alla faccia.

**Collo:** di media lunghezza, diritto, con ricca mantellina che copre le spalle.

**Dorso:** Lungo e largo.

**Ali:** larghe e grandi ben aderenti al corpo.

**Coda:** grande con abbondante piumaggio, portata mediamente alta.

**Petto:** pieno, largo, leggermente prominente.

**Zampe:** soggetti alti sulle zampe con tarsi di media lunghezza, gialli a macchie nere, fini, lisci, implumi, quattro dita.

**Ventre:** ben arrotondato e pieno.

**Pelle:** gialla.

**Struttura Piumaggio:** folto, ben aderente, con penne larghe e arrotondate e mantellina abbondante. Piumaggio nero brillante con riflessi verdi metallici. Il disegno è formato da una perla bianca a forma di "V" all'apice di alcune penne. Indicativamente la proporzione delle perle sul piumaggio è di una penna ogni tre.

Nel gallo, sul dorso, è di 1 a 5 e nelle lanceolate della mantellina e della groppa, dove la macchia è più piccola, di 1 ogni 2. Tutte le timoniere, le falciformi e le remiganti devono avere l'apice bianco.

La perlatura deve essere il più regolare possibile e non troppo grossa, il colore di fondo nero deve sempre dominare. Il bianco deve essere puro e il più nettamente possibile separato dal nero. La rachide segue il colore del disegno. La picchiettatura formerà un disegno regolare in alcune parti del piumaggio come le fasce dell'ala ed alla fine delle remiganti secondarie.

Tarsi gialli con picchiettatura da ardesia a nera; la scarsità della picchiettatura sui tarsi non è da considerarsi difetto grave. Piumino ardesia scuro. Unghie da corno a corno chiaro

**Colorazione Piumaggio:** livrea di colore nero picchiettato bianco.

## **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- cresta malformata, dritta nella gallina e piegata nel gallo;
- orecchioni rossastri o giallo intenso;
- petto poco sviluppato;
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc..)

### **Difetti della colorazione**

- picchiettatura molto impura;
- bianco predominante nelle remiganti e timoniere;
- assenza di riflessi verdi;
- presenza di tracce rossastre o presenza di riflessi bluastrì
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

## **2. BIANCA DI SALUZZO**

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Bianca di Cavour.

**AREA DI ORIGINE:** Regione Piemonte.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Razza a duplice attitudine. Elevata rusticità e buona pascolatrice. Elevata schiudibilità delle uova. Taglia medio-leggera.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio gallo alla maturità:** 2,4-2,8 kg.

**Peso medio gallina alla maturità:** 1,8-2,2 kg.

**Uovo:** Peso medio 52 - 60 grammi. Colorazione guscio: bianco rosato. Tasso di deposizione: 170 – 190 uova/anno

### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** di forma trapezoidale.

**Testa:** di media grandezza, proporzionata.

**Becco:** giallo.

**Cresta:** semplice formata da 4-7 denti portata diritta nel gallo, leggermente piegata di lato nelle galline.

**Bargigli:** rossi, ben sviluppati.

**Orecchioni:** ben sviluppati, di colore bianco o giallo, sono tollerati gli orecchioni rossi.

**Coda:** portata alta, di colore bianco, leggermente aperta nella gallina.

**Zampe:** di colore giallo.

**Pelle:** di colore giallo.

**Colorazione Piumaggio:** bianco perlaceo.

### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- cresta piegata nel gallo.
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.)
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

## **3. BIONDA PIEMONTESE**

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Bionda di Cuneo, Bionda di Villanova d'Asti, Bionda (o Rossa) delle Crivelle.

**AREA DI ORIGINE:** Regione Piemonte.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Tipica razza ruspante dalla forma raccolta e robusta. Razza a duplice attitudine dall'elevata capacità di deposizione ed elevata schiudibilità delle uova. Buona produzione di carne.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio gallo alla maturità:** 2,5-3,0 kg.

**Peso medio gallina alla maturità:** 1,8-2,5 kg.

**Uovo:** Peso medio 52 - 62 grammi. Colorazione guscio: bianco rosato. Tasso di deposizione: 180-200 uova/anno.

### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** largo, di media lunghezza, profondo.

**Testa:** di media grandezza, proporzionata.

**Becco:** giallo, con possibile striatura scura alla base.

**Cresta:** semplice, rossa, formata da 4 a 7 denti, diritta nel gallo, con la parte posteriore piegata nella gallina.

**Bargigli:** di media lunghezza, rossi, lisci.

**Orecchioni:** di media grandezza, allungati, di colore da bianco crema a giallo, sono tollerati gli orecchioni rossi con eventuali venature bianche.

**Coda:** di lunghezza media, portata aperta e alta, di colore nero, lunga e quadrata nella gallina, con riflessi colorati metallici nel gallo o ancora bianca o blu.

**Petto:** pieno, largo e prominente.

**Zampe:** gambe carnose ed evidenti, tarsi di media lunghezza e forti e di colore giallo.

**Tarsi e pelle:** di colore giallo.

**Struttura Piumaggio:** Folto e ben aderente al corpo, ricca mantellina.

**Colorazione Piumaggio:** di colore fulvo (camosciato o dorato in varia gradazione). In entrambi i sessi possono essere presenti remiganti primarie dello stesso colore della coda.

#### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- cresta piegata nel gallo
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.)
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

#### **4. COLLO NUDO ITALIANA (standard non disponibile)**

#### **5. ERMELLINATA DI ROVIGO**

**AREA DI ORIGINE:** Regione Veneto, provincia di Rovigo.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Pollo con buone attitudini per la produzione di uova e di carne con accrescimento abbastanza rapido.

##### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio gallo alla maturità:** 3,0-3,5 kg.

**Peso medio gallina alla maturità:** 2,2-2,6 kg.

**Uovo:** Peso medio 55 grammi. Colorazione guscio: da rosato a bruno

##### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** largo e lungo, a forma di parallelepipedo.

**Testa:** nel maschio medio grande, piatta. Nella gallina esile.

**Becco:** medio forte, leggermente convesso, di colore corno chiaro con cima scura.

**Occhi:** rossi, ammessi anche gialli.

**Cresta:** semplice e dritta con 5-6 dentelli. Nella gallina cresta piccola e diritta a dentellatura regolare.

**Bargigli:** simmetrici di normale conformazione.

**Faccia:** rossa e fine nel tessuto.

**Orecchioni:** rossi.

**Collo:** medio lungo con mantellina ricca.

**Dorso:** lungo, portato orizzontale.

**Ali:** ben aderenti, medio lunghe, portate orizzontali.

**Coda:** di media grandezza, portata larga a 30/40°, con numerose falciformi di media lunghezza con barbe larghe e calami non troppo marcati; timonieri corti e poco visibili.

**Petto:** pieno e largo, ben arrotondato e profondo.

**Zampe:** gialle con ossatura fine, nude, tarsi di media lunghezza che possono presentare venature rosse nel giallo.

**Cosce:** di media lunghezza, carnose, ben impiumate.

**Ventre:** largo e profondo.

**Struttura Piumaggio:** leggermente sciolto ma aderente, ricco.

**Colorazione Piumaggio:** classica ermellinata, mantello fondamentalmente bianco con mantellina a fiamme nere. Timoniere e remiganti macchiate di nero, coda perfettamente nera. La mantellina si adagia sul bianco candido del piumaggio senza allungarsi lungo il dorso (groppone).

#### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- pelle bianca
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc..)
- colorazione del piumaggio: marcatamente diversa da quella tipica e/o presenza di piumino
- vistosamente non bianco, con filoplume diffuse di colore nero

## **6. LIVORNO**

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Livornese.

**AREA DI ORIGINE:** Italia Centrale.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Pollo leggero, vivace e vigoroso, portamento elegante ed armonioso nelle proporzioni. Ha ottima capacità di deposizione, impennamento precoce, crescita veloce e scarsa attitudine alla cova.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio gallo alla maturità:** 2,0-2,7 kg.

**Peso medio gallina alla maturità:** 1,8–2,4 kg.

**Uovo:** Peso minimo 55 grammi. Colorazione guscio: bianco. Tasso di deposizione: 270-280 uova/anno

**Misura Anello:** Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.

### **CARATTERI TIPICI:**

**Testa:** di media grandezza e leggermente allungata.

**Becco:** di media lunghezza, leggermente ricurvo. Di colore giallo; ammesse tracce nerastre sul culmine nelle colorazioni barrata, blu e nera.

**Occhi:** grandi, molto vivaci. Iride rosso/arancio.

**Cresta:** semplice, rossa, ben sviluppata e ben dritta nel gallo. Cinque denti abbastanza profondi, regolarmente formati, larghi alla base; eccetto il primo gli altri sono di uguale altezza e larghezza; posizionati radiali all'occhio. Il lobo, ben formato, segue la linea della nuca senza avvicinarsi troppo. Nella gallina elegantemente ripiegata dopo il secondo dente senza coprire l'occhio.

**Bargigli:** ovali di media lunghezza e tessitura fine, rossi.

**Faccia:** rossa, liscia e senza peluria.

**Orecchioni:** ovali, di media grandezza, lisci e ben aderenti alla faccia. Di colore da bianco avorio a bianco crema.

**Collo:** di media lunghezza, portato eretto con abbondante mantellina

**Spalle:** larghe e ben arrotondate.

**Dorso:** mediamente lungo e largo; leggermente inclinato verso la groppa nel gallo; nella gallina quasi orizzontale. Passaggio dorso/coda il più armonioso possibile.

**Ali:** larghe, forti e ben aderenti al corpo.

**Coda:** grande con attaccatura larga, portata ben aperta e mediamente alta con un angolo, rispetto alla linea del dorso, di 55°/60° nel gallo e 40/45° nella gallina. Piccole e grandi falciformi abbondanti, ben sviluppate ed arrotondate.

**Petto:** pieno e largo.

**Zampe:** gambe di media lunghezza, forti, nettamente distinte dal tronco, specialmente nel gallo; tarsi gialli di media lunghezza, fini, senza piume; quattro dita. Unghie corno chiaro.

**Ventre:** ben sviluppato ed arrotondato, specialmente nella gallina.

**Pelle:** gialla.



**Struttura Piumaggio:** ben aderente al corpo senza formazione di cuscinetti sulla coda ed ai lati della sella.

**Colorazione Piumaggio:** Bianca, Blu, Collo Argento, Collo Arancio, Collo Oro, Nera, Splash. In tutte le colorazioni, piumaggio brillante e ricco di riflessi.

### **Colorazione COLLO ARANCIO**

**GALLO** molto variopinto: a scalare da arancio ad arancio chiaro fino ad arancio scuro/rosso superiormente con fiamme nere in mantellina e lanceolate; nero inferiormente così come petto, coda e copritrici delle ali. Triangolo dell'ala crema.

**GALLINA:** bruno chiara con testa giallo/arancio scuro e mantellina giallo/arancio chiaro con fiamme nere. Petto salmone. Ventre e gambe grigie. Coda nera. Remiganti primarie e secondarie nere con bordo esterno bruno chiaro. Fine pepatura nera nel piumaggio.

### **Colorazione COLLO ARGENTO**

**GALLO:** bianco argento superiormente con fiamme nere in mantellina e lanceolate; nero inferiormente così come petto, coda e copritrici delle ali. Triangolo dell'ala bianco puro

**GALLINA:** grigio argento superiormente con testa bianco argento e mantellina bianco argento con fiamme nere. Petto salmone. Ventre e gambe grigie. Coda nera. Remiganti primarie e secondarie nere con bordo esterno bianco argento. Fine pepatura nera nel piumaggio.

### **Colorazione COLLO ORO**

**GALLO:** molto variopinto: a scalare da giallo oro intenso a giallo oro chiaro fino a rosso scuro superiormente con fiamme nere in mantellina e lanceolate; nero inferiormente così come petto, coda e copritrici delle ali. Triangolo dell'ala bruno

**GALLINA:** bruna superiormente con testa giallo oro e mantellina giallo oro con fiamme nere. Petto salmone. Ventre e gambe grigio/bruno. Coda nera. Remiganti primarie e secondarie nere con bordo esterno bruno. Fine pepatura nera nel piumaggio.

### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- tipologia troppo simile all'Italiana;
- cresta dritta nelle galline, troppo grande o con il lobo che tocca la nuca;
- cresta non ben formata, denti privi della forma richiesta;
- bargigli aperti a farfalla, troppo lunghi o con pieghe sia orizzontali che verticali; ♣
- orecchioni anche leggermente macchiati di rosso o giallo intenso;
- tarsi di colorazione diversa dal giallo uniforme;
- colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche.
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc..)

## 7. MERICANEL DELLA BRIANZA

**AREA DI ORIGINE:** Regione Lombardia.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Selezionata agli inizi del secolo partendo da polli rurali nani allevati allo stato brado e con spiccata attitudine alla cova. E' apprezzata per le sue doti di chioccia alla quale affidare le uova di selvaggina o di altre razze prive di attitudine alla cova. Unica razza nana riconosciuta.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio gallo alla maturità:** 0,7-1,1 kg.

**Peso medio gallina alla maturità:** 0,6-0,9 kg.

**Uovo:** Peso medio 33-35 grammi, con range 19-47 grammi. Colorazione guscio: da crema a bruno.

**Misura Anello:** Gallo 11 mm, Gallina 9 mm.

### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** di forma cilindrica, corto, arrotondato portato leggermente inclinato; struttura ossea molto fine.

**Testa:** piccola, molto espressiva.

**Becco:** corto, leggermente incurvato, da giallo a corno.

**Occhi:** arancio, espressivi, proporzionati alla grandezza della testa.

**Cresta:** semplice, dritta, rossa, di tessitura fine, impiantata stretta, cinque dentelli con il lobo che si stacca nettamente dalla nuca; nella gallina può essere portata piegata su un lato senza coprire l'occhio ma spesso è dritta.

**Bargigli:** ovali, piccoli e rossi.

**Faccia:** rossa, di tessitura fine.

**Orecchioni:** Allungati a forma di mandorla, piccoli, lisci e rossi.

**Collo:** mediamente lungo, ben arcuato, con mantellina abbondante.

**Spalle:** arrotondate, portate alte.

**Dorso:** corto, portato leggermente inclinato verso la groppa, con linea ben arrotondata.

**Ali:** lunghe ed aderenti.

**Coda:** di media grandezza, portata alta, con abbondanti falciformi e timoniere lunghe e portate aperte.

**Petto:** arrotondato, prominente.

**Zampe:** gambe corte; tarsi di colore giallo zafferano mediamente lunghi, lisci, fini, senza piume, quattro dita.

**Unghie:** corno

**Ventre:** largo e ben sviluppato.

**Pelle:** morbida, gialla.

**Struttura Piumaggio:** rigido, ricco con penne larghe.

**Colorazione Piumaggio:** Bianca, Nera, Collo Argento, Collo Oro e Pile.

### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- assenza di vivacità;
- tronco eccessivamente lungo e portato orizzontale;
- testa grossolana;
- cresta spessa;
- tarsi eccessivamente lunghi di colore biancastro o ardesia;
- piumaggio scarso;
- Evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, etc.);
- Colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche.

## **8. MILLEFIORI DI LONIGO**

**AREA DI ORIGINE:** Regione Veneto

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Razza rustica con buone produzioni di carne e uova. Ha una discreta tendenza alla cova e alla cura della prole che la rende buona balia per razze prive di questa attitudine.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio gallo alla maturità:** 2,5-3,0 kg.

**Peso medio gallina alla maturità:** 2,0-2,4 kg.

**Uovo:** Peso medio 60 grammi. Colorazione guscio: tendenzialmente bianco.

### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** Lungo, largo.

**Testa:** allungata, di media grandezza, elegante.

**Becco:** forte di color giallo, talvolta leggermente tendente al corneo sul culmine.

**Occhi:** grandi, vivaci. Iride di colore rosso-arancio.

**Cresta:** semplice, ben sviluppata. Diritta nel gallo e ripiegata da un lato nella femmina.

**Bargigli:** simmetrici di normale conformazione.

**Faccia:** rossa di tessitura fine.

**Orecchioni:** ben sviluppati di colore bianco o leggermente avorio.

**Collo:** lungo, portato diritto e ben ornato di penne.

**Dorso:** lungo, largo con groppa ben impiumata.

**Ali:** lunghe portate alte e chiuse.

**Coda:** larga, non portata alta

**Petto:** pieno e largo leggermente prominente

**Zampe:** di media lunghezza, tarsi nudi e gialli

**Ventre:** ben arrotondato e pieno.

**Pelle:** gialla.

**Struttura Piumaggio:** sciolto, folto.

**Colorazione Piumaggio:** Fulvo macchiato nei pulcini. Piumaggio degli adulti pezzato di macchie (più spesso chiare o nere) su un colore dominante che è principalmente il rosso o l'arancione scuro (millefiori).

#### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- cresta : biforcazione finale anomala;
- orecchioni di colore rosso;
- tarsi scuri.
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, etc.);
- colorazione del piumaggio marcatamente diversa da quella tipica.

### **9. MILLEFIORI PIEMONTESE (standard non disponibile)**

### **10. MODENESE**

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Pollo Modenese, Gallina Modenese, Fulva di Modena.

**AREA DI ORIGINE:** Regione Emilia-Romagna.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Razza piuttosto uniforme per la taglia ma estremamente difforme per la livrea. Taglia medio-grande di ottima rusticità.

#### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio gallo alla maturità:** 2,5-3,2 kg.

**Peso medio gallina alla maturità:** 1,9-2,6 kg.

**Uovo:** Peso minimo 55 grammi. Colorazione guscio: bianco.

**Misura Anello:** Gallo n.d. mm, Gallina n.d. mm.

## **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** cilindrico. Presenta le caratteristiche tipiche del pollo omeosomo, è pertanto da ascrivere a tutti gli effetti al tipo autoctono mediterraneo.

**Testa:** di media grandezza.

**Becco:** giallo screziato a volte di bruno.

**Occhi:** grandi, molto vivaci di colore bruno arancio.

**Cresta:** semplice di grande sviluppo, eretta nel gallo e ripiegata su un lato della testa nella gallina, specialmente nelle prime fasi della deposizione. La tessitura è media con presenza di fine granulazione.

**Bargigli:** molto sviluppati, rossi.

**Faccia:** rossa.

**Orecchioni:** tendenti al bianco giallastro con alcune tracce rosse.

**Collo:** mediamente corto, armonico, presenta una folta mantellina.

**Spalle:** larghe e ben arrotondate.

**Ali:** ben aderenti al corpo.

**Coda:** sviluppata. Le falciformi del gallo sviluppate ma molto meno accentuate rispetto a razze analoghe.

**Petto:** largo e profondo con masse pettorali non eccessivamente sviluppate.

**Zampe:** tarsi mediamente lunghi di conformazione piuttosto sottile con quattro dita. Il colore è giallo intenso e subisce variazione solo nelle galline sottoposte a lunghi cicli produttivi.

**Pelle:** gialla con variazione di intensità a seconda del regime alimentare.

**Colorazione Piumaggio:** dorata frumento e dorata frumento blu.

## **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- creste ad esse;
- orecchioni eccessivamente rossi;
- cresta eretta nella femmina;
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.);
- colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche.

## 11. MUGELLESE

**ALTRA DENOMINAZIONE:** Gallina Mugellese

**AREA DI ORIGINE:** Toscana. Il nome la collegherebbe all'areale del Mugello, tuttavia presente in maniera sporadica e puntiforme anche in altre parti della Toscana (Province di Firenze, Siena, Grosseto, Valdarno).

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Pollo nano ben impiantato e solido. Le galline sono covatrici e buone madri. I capponi venivano usati per condurre i pulcini appena dopo la nascita. Di carattere molto vivace e sempre in movimento anche se docile.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio gallo alla maturità:** kg 0,900-1,00

**Peso medio gallina alla maturità:** kg 0,700 – 0,800

**Uovo:** Peso minimo 35 g. Colorazione del guscio: bianco crema.

**Misura Anello:** Gallo 14 mm, Gallina 12mm

### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** cilindrico, specialmente nella gallina. Compatto.

**Testa:** rotonda, di media grandezza.

**Becco:** di media lunghezza, leggermente ricurvo, di colore corno o leggermente striato nella ranfoteca superiore.

**Occhi:** vivaci, di colore da arancio a rosso.

**Cresta:** semplice con 4-6 denti, diritta. Ben impiantata, di tessitura non troppo fine, segue la linea della nuca senza appoggiarvisi. Nella gallina denti non troppo incisi, ammessa leggermente piegata.

**Bargigli:** medio grandi, ben arrotondati, di tessitura abbastanza fine.

**Faccia:** liscia rossa e senza plumole.

**Orecchioni:** rossi, di tessitura fine e senza pieghe, tollerata una leggera presenza di bianco.

**Collo:** medio corto e ben arcuato. Ricco di lanceolate

**Spalle:** larghe.

**Dorso:** lunghezza media, leggermente inclinato all'indietro, di più nel gallo.

**Ali:** abbastanza lunghe, orizzontali.

**Petto:** petto largo, arrotondato e prominente.

**Coda:** portata a 45° nei galli, più bassa nelle galline, con falciformi non troppo arcuate e timoniere abbastanza aperte.

**Ventre:** ben sviluppato, specialmente nelle galline in deposizione.

**Zampe:** non troppo evidenti e tarsi non troppo lunghi, solidi e di medio diametro. Tarsi color carne, unghie color corno chiaro.

**Pelle:** fine e rosea.

**Struttura Piumaggio:** abbondante e ben aderente al corpo, abbastanza morbido ma senza cuscinetti.

**Colorazione Piumaggio:** Collo Oro, Dorata

### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- Presenza di difetti genetici (ad esempio l'ala a forbice);
- Colore degli orecchioni diverso dal rosso o dal rosso con striature bianche.
- Evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc..)
- Colorazione del guscio diversa da bianco crema;
- Colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche;
- Tarsi calzati e/o di colorazione diversa dal color carne.

## **12. PADOVANA**

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Padovana dal gran ciuffo.

**AREA DI ORIGINE:** Regione Veneto.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** pollo medio-leggero, elegante, vivace ed ornamentale con corpo mediamente lungo caratterizzato dal ciuffo voluminoso e dalla barba molto sviluppata. Buona produttrice di uova dalle grandi dimensioni (50-60 grammi). La carne è magra, di colore bianco rosato di sapore molto delicato.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio gallo alla maturità:** 1,8-2,5 kg.

**Peso medio gallina alla maturità:** 1,5-2,0 kg.

**Uovo:** Peso medio 50-60 grammi. Colorazione guscio: bianco.

### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** leggermente allungato e inclinato, largo alle spalle e si restringe verso la groppa. Nella gallina la forma è più compressa e più bassa e il portamento più orizzontale del gallo.

**Testa:** di media grandezza, presenta un'ernia craniale molto sviluppata e ciuffo voluminoso.

**Becco:** forte, leggermente arcuato, con narici ingrossate.

**Occhi:** grandi, rotondi, vivaci; il colore è bruno in tutte le colorazioni tranne nella bianca e nello sparviero dove è rosso arancio.

**Cresta:** assente; la presenza di piccole escrescenze carnose non è considerata un difetto.

**Bargigli:** assenti o rudimentali, comunque nascosti dalla barba.

**Faccia:** rossa, ricoperta dalla folta barba.

**Orecchioni:** assenti o molto piccoli, nascosti dalla barba e dal ciuffo, tendenzialmente bianchi.

**Barba:** piena, abbondante, divisa in tre parti, con i favoriti che coprono la faccia e la barba propriamente detta che copre completamente la gola;

**Ciuffo:** nei due sessi non deve impedire la visuale;

**Gallo:** grande con penne lunghe ma che lasciano liberi gli occhi, strette ed appuntite ricadenti indietro sulla nuca. Di forma circolare. **Gallina:** grande a forma di fiocco, come una palla, pieno.

**Collo:** di lunghezza media, pieno con mantellina abbondante.

**Dorso:** di lunghezza media, portato leggermente inclinato verso la groppa che è abbondantemente impiumata.

**Ali:** di media lunghezza, portate orizzontali ed aderenti al corpo.

**Coda:** piena, portata semiaperta nella gallina, larga nel gallo, con falciformi ben arcuate.

**Petto:** pieno, ben arrotondato.

**Zampe:** lunghezza media, evidenti e ben impiumate; tarsi di lunghezza media, fini, privi di piume e quattro dita. Tarsi di colore blu-ardesia o grigio-piombo.

**Ventre:** ben sviluppato, morbido.

**Pelle:** morbida, bianca.

**Struttura Piumaggio:** ben sviluppato ma piatto ed aderente; con punta delle penne arrotondata, piumino folto.

**Colorazione Piumaggio:** Dorata (penne fulve orlate di nero), Camosciata (penne fulve orlate di bianco), Argentata (penne bianco-argento orlato di nero).

## **COLORAZIONE DORATA (penne fulve orlate di nero)**

### **GALLO**

**Piumaggio in generale:** fulvo dorato scuro con fine orlatura nera dai riflessi verde brillante.

**Barba:** fulva con fiamma nera.

**Ciuffo, mantellina e lanceolate della groppa:** fulva con fiamma nera e possibile lancia fulva al centro. Rachide del colore del disegno.

**Piccole copritrici delle ali:** con accennato orlo nero.

**Mantellina lanceolate della groppa:** penne a base nera con fiamma

**Grandi copritrici delle ali:** orlate il più possibile sottilmente di nero, formano le fasce.

**Remiganti primarie e secondarie:** fulve dorate, barbe esterne con margine nero.

**Coda:** il più possibile fulvo dorato puro, specialmente le falciformi, ogni penna con margine nero.

**Piumino:** grigio scuro.

**Becco:** blu ardesia.



**Tarsi:** blu ardesia.

## GALLINA

**Piumaggio in generale:** ogni penna oca dorato con fine e regolare orlatura nera.

**Ciuffo:** fulvo con fine orlatura nera.

**Barba:** nera con al centro una lancia dorata.

**Remiganti primarie e secondarie:** fulve, barbe esterne con margine nero. Fasce delle ali possibilmente ben disegnate.

## COLORAZIONE CAMOSCIATA (penne fulve orlate di bianco)

### GALLO

**Piumaggio in generale:** camoscio, nella tonalità cuoio, con fine orlatura bianco crema.

**Barba:** color panna tendente al bianco.

**Ciuffo:** camoscio più scuro con fiamma bianco crema e possibile lancia color camoscio. Rachide del colore del disegno.

**Mantellina e lanceolate della groppa:** oro giallo.

**Piccole copritrici delle ali:** camoscio più scuro.

**Grandi copritrici delle ali:** orlate il più possibile sottilmente di bianco crema, formano le fasce.

**Remiganti primarie e secondarie:** camoscio, barbe esterne con margine bianco crema.

**Coda:** il più possibile camoscio puro, specialmente le falciformi, ogni penna con margine bianco crema.

**Piumino:** crema.

**Becco:** grigio blu.

**Tarsi:** grigio blu.

### GALLINA

**Piumaggio in generale:** ogni penna camoscio con fine e regolare orlatura bianco crema.

**Ciuffo:** camoscio con fine orlatura bianco crema.

**Barba:** color panna tendente al bianco.

**Remiganti primarie e secondarie:** camoscio, barbe esterne con margine bianco crema. Fasce delle ali possibilmente ben disegnate.

## COLORAZIONE ARGENTATA (penne bianco-argento orlate di nero)

### GALLO

**Piumaggio in generale:** bianco aperto con evidente, ma minore, presenza di colore nero con riflessi verde brillante.

**Barba:** dominante il nero, che risalta sulla mantellina del collo prevalentemente argento.

**Ciuffo:** penne a base nera con fiamma assiale bianca sfrangiata distalmente, rachide bianco. Assiale bianca sfrangiata distalmente, rachide bianco.

**Piccole copritrici delle ali:** argento orlato nero uniforme.

**Grandi copritrici delle ali:** argento con orlo nero: sottile ai lati, più spesso al vertice.

**Remiganti primarie e secondarie:** argento prevalente; primarie con sottile orlo nero agli apici; secondarie con orlo nero sottile ai lati e più marcato all'apice.

**Coda:** il più possibile argento, specialmente le falciformi, ogni penna con orlo nero.

**Piumino:** bianco argento.

**Becco:** grigio blu.  
**Tarsi:** grigio blu

## GALLINA

**Piumaggio in generale:** ogni penna argento con fine e regolare orlatura nera.  
**Ciuffo:** argento con fine e regolare orlatura nera.  
**Barba:** nera.  
**Remiganti primarie e secondarie:** argento orlato nero, più marcate all'apice.

### CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:

- presenza di cresta;
- bargigli molto visibili;
- orecchioni molto visibili;
- ciuffo assente e/o assenza di ernia craniale.
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba ecc...)
- Colorazione del piumaggio marcatamente diversa da quella tipica e con riferimento alle colorazioni:

**colorazione camosciata:** presenza di penne bianche molto evidenti nel ciuffo, penne completamente bianche nelle remiganti e nelle timoniere.

**colorazione dorata:** presenza di penne bianche o nere molto evidenti nel ciuffo, presenza di penne completamente bianche nelle remiganti e nelle timoniere.

**colorazione argentata** presenza di penne bianche nel ciuffo, doppia orlatura nero argento verso l'esterno, presenza nel gallo di marcata colorazione giallo paglierino sul dorso e sulla groppa.

## 13. PEPOI

**AREA DI ORIGINE:** Regione Veneto.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** razza di taglia piccola, rustica, facile da allevare e consigliata per la produzione del pollo-porzione. I polli Pépoi presentano buone masse muscolari del petto, ottime per lo spiedo; le carni sono molto saporite. Spiccata attitudine alla cova e alla cura dei pulcini.

### DATI BIOMETRICI:

**Peso medio gallo alla maturità:** 1,3-1,5 kg.

**Peso medio gallina alla maturità:** 1,0-1,1 kg.

**Uovo:** Peso medio 40-45 grammi. Colorazione guscio: rosato.

### CARATTERI TIPICI:

**Tronco:** leggermente allungato ed inclinato, nella gallina la forma è più compressa e portato più orizzontale.

**Testa:** minuta con cresta dritta e semplice

**Becco:** giallo, leggermente convesso

**Occhi:** rotondi e vivaci

**Cresta:** semplice e dritta.

**Bargigli:** simmetrici di normale conformazione

**Faccia:** liscia e fine nei tessuti

**Orecchioni:** tendenzialmente bianchi

**Collo:** medio e lungo con mantellina

**Dorso:** forma un arco ben equilibrato

**Ali:** ben aderenti al corpo

**Coda:** nel maschio portata alta, nella femmina portata a ventaglio

**Petto:** pieno e proporzionato

**Zampe:** gialle senza piume/piumino.

**Pelle:** gialla.

**Colorazione Piumaggio:** i pulcini hanno piumino marrone chiaro con striature più scure sul dorso e sul capo. Negli adulti il piumaggio è di colore dorato.

## **GALLO**

**Testa e mantellina:** dorata.

**Dorso:** rosso dorato.

**Petto:** nero.

**Ventre e cosce:** nere.

**Coda:** nera con riflessi verdi.

**Piumino:** grigio.

## **GALLINA**

**Testa e mantellina:** gialla.

**Dorso, spalle e copritrice delle ali:** colore di fondo brunastro uniforme. Ogni penna è sfumata di nero, con una netta orlatura dorata brillante.

**Petto:** salmone.

**Ventre e zampe:** bruno cenere con orlatura e disegno sulla rachide delle penne.

**Coda:** nera con riflessi bruni.

**Piumino:** grigio.

## **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- Pelle bianca;
- tarsi bianchi, presenza di abbozzi di piume.
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.)
- colorazione del piumaggio marcatamente diversa da quella tipica; bianco nelle remiganti, nelle galline colore di fondo troppo chiaro o troppo scuro.

## 14. POLLO TRENTINO

**AREA DI ORIGINE:** Provincia di Trento.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** pollo a lento accrescimento di forma armonica di tipo “mediterraneo”. Razza a duplice attitudine che si presta bene all’allevamento biologico.

**DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio gallo alla maturità:** 2,5-3,0 kg.

**Peso medio gallina alla maturità:** 2,0–2,4 kg.

**Uovo:** Peso minimo n.d. grammi. Colorazione guscio: bianco.

**CARATTERI TIPICI:**

**Portamento:** eretto, agile ed elegante.

**Becco:** forte di colore giallo, talvolta leggermente tendente al corneo sul culmine.

**Occhi:** grandi; molto vivaci. Iride rosso-arancio.

**Cresta:** semplice molto sviluppata, diritta nel gallo e ripiegata da un lato nella femmina.

**Bargigli:** allungati e sviluppati.

**Orecchioni:** ben sviluppati, di colore bianco o leggermente avorio.

**Zampe:** Tarsi nudi di colore giallo.

**Pelle:** gialla.

**Colorazione Piumaggio:** dorato. Piumino dei pulcini striato tipo selvatico.

**CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba ecc.)

## 15. POLVERARA

**ALTRE DENOMINAZIONI:** “Padovana di Polverara”, “Schiatta di Polverara” o “Schiatta”.

**AREA DI ORIGINE:** Regione Veneto.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Pollo medio-leggero con portamento elegante, un ciuffo ritto sulla testa e sporgente in avanti. Razza rustica che si presta bene all’allevamento all’aperto. Produce eccellente carne morata (scura) ed è buona ovaia.

**DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio gallo alla maturità:** 1,8-2,2 kg.

**Peso medio gallina alla maturità:** 1,3–1,8 kg.

**Uovo:** Peso medio 50 grammi. Colorazione guscio: bianco

## **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** leggermente allungato.

**Testa:** di media grandezza, assenza di ernia craniale.

**Becco:** leggermente arcuato. Narici ben rilevate a volte con un terzo cornetto.

**Occhi:** grandi, rotondi, vivaci; colore rosso/arancio fino a bruno.

**Cresta:** assente, presenza di cornetti piccoli e rossi, a forma di "V" leggermente schiacciati.

**Bargigli:** rudimentali, piuttosto piccoli, rossi.

**Faccia:** rossa con barba.

**Orecchioni:** grandezza media-piccola, ovali, colore bianco candido nascosti dalle basette.

**Barba:** alla gola copre anche i bargigli e si accompagna con due favoriti alle guance.

**Ciuffo:** formato da piume flessuose e lunghe, relativamente piccolo, portato diritto sulla testa senza coprire gli occhi.

**Collo:** di lunghezza media, pieno con mantellina abbondante e lanceolate lunghe e sottili nel gallo.

**Spalle:** larghe e arrotondate.

**Dorso:** di lunghezza media, portato leggermente inclinato verso la groppa.

**Ali:** mediamente lunghe, portate aderenti al corpo.

**Coda:** piena e portata leggermente a ventaglio nella femmina. Larga nel gallo con falciformi ben arcuate e sviluppate, portata alta.

**Petto:** pieno.

**Zampe:** gambe moderatamente lunghe, evidenti e ben impiumate. Tarsi preferibilmente di colore verde salice oppure ardesia, di media lunghezza, fini, senza piume, quattro dita.

**Ventre:** ben sviluppato, morbido.

**Pelle:** morbida, bianca o gialla, carne morata.

**Struttura Piumaggio:** ben aderente, piumino folto.

### **Colorazione Piumaggio:**

**NERA:** Piumaggio nero intenso e brillante con forti riflessi verdi nei due sessi. Becco corno scuro con striature nere. Piumino nero.

**BIANCA:** Piumaggio bianco brillante. Becco giallo rosato. Piumino bianco.

## **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- ciuffo troppo aperto, tipo ortensia della padovana;
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc);
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica nella colorazione nera presenza di riflessi ruggini
- nella mantellina del gallo, nella bianca presenza di penne di altro colore.

## **16. ROBUSTA LIONATA**

**AREA DI ORIGINE:** Regione Veneto.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Pollo con buona attitudine alla produzione di uova e di carne con accrescimento abbastanza rapido. Razza medio-grande dotata di buona robustezza.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio gallo alla maturità:** 4,0-4,5 kg.

**Peso medio gallina alla maturità:** 2,8-3,3 kg.

**Uovo:** Peso medio 55-60 grammi. Colorazione guscio: rosato.

### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** largo e profondo.

**Testa:** piccola e ben arrotondata.

**Becco:** forte, leggermente convesso.

**Occhi:** da arancione a rosso.

**Cresta:** semplice e dritta, medio grande con 5-6 dentelli.

**Bargigli:** di media grandezza, rotondi e rossi.

**Faccia:** liscia e fine nei tessuti.

**Orecchioni:** rossi.

**Collo:** medio lungo, leggermente arcuato.

**Dorso:** ben sviluppato, la linea collo-dorso-coda forma un arco ben equilibrato.

**Ali:** portate orizzontalmente e ben aderenti, medio lunghe.

**Coda:** corta e larga, timoniere parzialmente nascoste dalle falciformi.

**Petto:** profondo, largo e ben sviluppato.

**Zampe:** gialle, tarsi corti e nudi.

**Cosce:** carnose, plumule folte senza cuscini.

**Ventre:** largo, profondo e ricco di piumaggio.

**Pelle:** gialla.

**Struttura Piumaggio:** folto, leggermente sciolto.

**Colorazione Piumaggio:** colore base giallo-fulvo in tonalità calda, remiganti con venatura bruna nelle galline è ammesso leggero disegno sul groppone (dorso) e una mantellina leggera, con punti o perniciature nere irregolari tutte le penne caudali finiscono nere con brillantezza verde.

#### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- orecchioni: bianchi;
- pelle: bianca;
- zampe: bianche, mancanza di unghie.
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.)
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica; piumino grigio, penne del groppone del dorso scure o con disegno molto evidente, nelle ali presenza di bande bianche.

### **17.ROBUSTA MACULATA**

**AREA DI ORIGINE:** Regione Veneto.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Razza medio-pesante con buona attitudine alla produzione di uova e di carne. Precocità media.

#### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio gallo alla maturità:** 4,0-4,5 kg.

**Peso medio gallina alla maturità:** 2,8-3,3 kg.

**Uovo:** Peso medio 55 grammi. Colorazione guscio: rosato.

#### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** largo e profondo.

**Testa:** medio grande, ben arrotondata.

**Becco:** forte, leggermente convesso.

**Occhi:** da arancione a rosso.

**Cresta:** semplice, dritta, ben sviluppata, con 6-8 dentelli.

**Bargigli:** di media grandezza, rotondi e rossi.

**Faccia:** liscia e fine nei tessuti.

**Orecchioni:** rossi.

**Collo:** medio lungo, leggermente arcuato.

**Dorso:** largo sulle spalle, ben sviluppato.

**Ali:** portate orizzontali e ben aderenti.

**Coda:** corta e larga.

**Petto:** profondo e lungo.

**Zampe:** di media lunghezza. Tarsi corti gialli e nudi.

**Cosce:** carnose, ricche di piume senza cuscini.

**Ventre:** lungo, profondo e ricco di piumaggio.

**Pelle:** gialla.

**Struttura Piumaggio:** sciolto, folto, liscio.

**Colorazione Piumaggio:**

**Gallo:** mantellina bianco argento con fiamma nera sfondante; rimanente piumaggio argento oscuro con macule nere sparse in modo regolare; remiganti, timoniere e falciformi neri con brillantezza verde.

**Gallina:** colore base bianco argento, grosse macchie di color nero diffuse regolarmente su tutto il corpo.

**CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- orecchioni bianchi;
- dorso presenza di gobba;
- pelle bianca;
- zampe bianche, dita molto storte;
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba ecc.)
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

## 18. ROMAGNOLO

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Pollo Romagnolo o Gallina Romagnola.

**AREA DI ORIGINE:** Regione Emilia Romagna.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Razza primitiva, piuttosto uniforme per la taglia ma estremamente difforme per livrea, colore dei tarsi e della pelle. Ottima la rusticità.

**DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio gallo alla maturità:** 2,0-2,5 kg.

**Peso medio gallina alla maturità:** 1,9–2,0 kg.



**Uovo:** Peso minimo 55 grammi. Colorazione guscio: bianco liscio. Tasso di deposizione: 150-180 uova/anno

### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** cilindrico, leggermente inclinato verso la groppa. Presenta le caratteristiche tipiche del pollo omeosomo, è pertanto da ascrivere a tutti gli effetti al tipo autoctono mediterraneo.

**Testa:** di media grandezza.

**Becco:** piuttosto corto ma forte e leggermente curvo. Grigio bluastrò, avorio o di colorazione giallo screziato di bruno.

**Occhi:** grandi, molto vivaci da arancio a bruno scuro a nero con pupilla prominente.

**Cresta:** semplice, di sviluppo medio grande con cinque o più denti con il lobo che segue la nuca (non sempre). Nel gallo è eretta e nella gallina è portata piegata su un lato della testa. La tessitura è fine senza granulazioni.

**Bargigli:** mediamente sviluppati, rossi.

**Faccia:** rossa.

**Orecchioni:** piccoli, chiari, tendenti al bianco puro a volte ombreggiati di blu e giallo crema.

**Collo:** armonico, di lunghezza media e mantellina ben sviluppata.

**Spalle:** piuttosto larghe e ben arrotondate.

**Ali:** ben aderenti al corpo.

**Coda:** ben sviluppata con attaccatura larga conferisce agli animali un aspetto elegante ed armonico. Le falciformi del gallo sono piuttosto sviluppate.

**Petto:** largo e profondo con masse pettorali non eccessivamente sviluppate. Negli animali adulti di età superiore ai dodici mesi, si assiste ad un notevole aumento delle masse pettorali.

**Zampe:** tarsi mediamente lunghi, conformazione piuttosto sottile, con quattro dita di colore prevalente grigio piombo. Sono sporadicamente presenti colorazioni dei tarsi rosei o maculati e raramente tarsi gialli o verdi.

**Pelle:** di colore bianco avorio.

**Colorazione Piumaggio:** oro fiocchi neri, argento fiocchi neri, moschettata oro ed argento, betulla argento, perniciato molto scuro, barrato argento ed oro, bianco-columbia, testa di moro, bianca, sparviero. Le colorazioni non vengono selezionate singolarmente e vengono mantenute tradizionalmente in promiscuità.

### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche.
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba ecc.)

## 19. VALDARNESE BIANCA

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Valdarnese.

**AREA DI ORIGINE:** Regione Toscana.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Razza dotata di ottima rusticità e elevata capacità di adattamento alle condizioni climatiche avverse. La gallina presenta ancora l'attitudine alla cova, ed è pertanto una mediocre produttrice di uova. Le carni sono di qualità eccellente.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio gallo alla maturità:** 2,9-3,3 kg.

**Peso medio gallina alla maturità:** 2,0-2,5 kg.

**Uovo:** Peso medio 60-65 grammi. Colorazione guscio: bianco avorio. Tasso di deposizione: 130-140 uova/anno.

### **CARATTERI TIPICI:**

**Testa:** ben proporzionata.

**Becco:** becco leggermente ricurvo di colore giallo-oro antico.

**Occhi:** grandi e vivaci con iride rosso-arancione.

**Cresta:** molto sviluppata, specie nel maschio. Di colore rosso sangue. Semplice e carnosa, eretta, con 5-6 denti nel gallo e piegata nella gallina.

**Bargigli:** molto sviluppati, soprattutto nel maschio, di colore rosso sangue.

**Faccia:** rossa e liscia.

**Orecchioni:** di colore giallo crema con qualche venatura rossa.

**Collo:** robusto, con folta mantellina.

**Dorso:** lungo, piatto e largo in corrispondenza delle spalle.

**Ali:** ben sviluppate e aderenti al corpo.

**Coda:** a ciuffo, con falciformi brevi nel gallo.

**Petto:** ampio e prominente.

**Zampe:** gambe forti, carnose; tarsi non troppo lunghi, forti, senza piume e di colore giallo-arancio.

**Ventre:** ben sviluppato e pieno.

**Pelle:** gialla.

**Struttura Piumaggio:** folto, leggermente sciolto. L'impennamento è tardivo, specie nel maschio.

**Colorazione Piumaggio:** bianco ma non candido e, limitatamente al dorso e alla mantellina nei galli adulti, tendente al giallo paglierino lucente.

#### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- corpo stretto;
- petto alto e piatto;
- pelle e/o tarsi bianchi;
- presenza di colore bianco negli orecchioni;
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba ecc.)
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

## **20. VALDARNO (standard non disponibile);**

## **21. SICILIANA**

**AREA DI ORIGINE:** Regione Sicilia.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Pollo vivace, molto precoce e con spiccata attitudine alla deposizione. E' caratterizzato dalla tipica cresta a coppa.

#### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio gallo alla maturità:** 2,0-2,4 kg.

**Peso medio gallina alla maturità:** 1,6-1,8 kg.

**Uovo:** Peso minimo 45 grammi. Colorazione guscio: dal bianco al brunastro chiaro. Tasso di deposizione: n.d.

**Misura Anello:** *Gallo* 18 mm, *Gallina* 16 mm.

#### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** di lunghezza media e raccolto.

**Testa:** elegante ed arrotondata, abbastanza larga e profonda.

**Becco:** forte di media lunghezza e di colore giallo; ammesse leggere striature corno scuro nelle colorazioni nera e collo oro.

**Occhi:** grandi, vivaci e prominenti di colore rosso/arancio scuro.

**Cresta:** di tessitura fine e rossa; inizia come cresta semplice alla base del becco per poi acquistare la forma a coppa, preferibilmente chiusa nella parte posteriore. Coppa ben formata, liscia all'interno. Preferibili 5 denti regolari per parte, non troppo lunghi, ben definiti ed a base non troppo larga; portata dritta e bene in appiombato. In galline che depongono è ammessa leggermente pendente.

**Bargigli:** rossi, di media grandezza; portati ben distesi e non aperti a farfalla, privi di pieghe sia verticali che orizzontali.

**Faccia:** rosso intenso, liscia e senza peluria.

**Orecchioni:** di media grandezza, fini, ben arrotondati, rossi; è tollerata una leggera presenza di bianco.

**Collo:** ben arcuato, elegante, con abbondante mantellina.

**Spalle:** larghe, ben arrotondate.

**Dorso:** largo, non troppo lungo.

**Ali:** lunghe, portate alte ed aderenti.

**Coda:** abbastanza larga, con lunghe timoniere, portata abbastanza alta con un angolo di 70/75° nel gallo e di 55/60° nella gallina.

**Petto:** largo, pieno ed arrotondato, portato alto.

**Zampe:** di media grandezza ben staccate dal tronco; tarsi sottili e moderatamente lunghi di colore verde salice.

**Ventre:** ben sviluppato e arrotondato.

**Pelle:** morbida e giallastra.

**Struttura Piumaggio:** Abbondante e morbido; ben aderente al corpo senza formare cuscinetti.

**Colorazione Piumaggio:** selvatica bruna, collo oro, bianca, nera e blu.

#### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- coda a scoiattolo;
- orecchioni troppo bianchi;
- presenza di infossature o escrescenze nella coppa;
- cresta del gallo poco sviluppata o piegata, posteriormente aperta divaricata, con denti filiformi o troppo lunghi;
- colore dei tarsi diverso dal verde salice;
- tarsi impiumati;
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba ecc.);
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

## **22.TIROLESE o TIROLERHUHN**

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Pollo Tirolese.

**AREA DI ORIGINE:** Zona della Ex-monarchia austriaca, Province di Bolzano e di Trento (IT), Tirolo, Salisburgo e Vorarlberg (A), Cantoni dei Grigioni e di San Gallo (CH).

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** pollo robusto e elegante, lunghezza del corpo media, ciuffo caratteristico poco voluminoso e indirizzato verso avanti, e barba ben sviluppata. Le femmine

hanno una buona attitudine alla cova. Generalmente allevata su masi in modo estensivo con pascolo, produzione di carne e uova (ca. 50-60 grammi). La carne morata è magra e saporita.

**DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio gallo alla maturità:** 2,0-2,6 kg.

**Peso medio gallina alla maturità:** 1,7-2,1 kg.

**Uovo:** Peso minimo 50 grammi. Colorazione guscio: bianco candido e biancastro. Tasso di deposizione: 160-200 uova/anno.

**Misura Anello:** *Gallo* 18 mm, *Gallina* 16 mm.

**CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** cilindrico, di media lunghezza, ben arrotondato.

**Testa:** compatta, di media grandezza, ernia craniale sviluppata, ciuffo poco voluminoso e indirizzato verso avanti.

**Becco:** forte, leggermente ricurvo. Alle narici piccola protuberanza di colore rosso.

**Occhi:** grandi; molto vivaci.

**Cresta:** a cornetti piccoli e rossi, a forma di "V" leggermente schiacciati. Nella gallina appena accennati.

**Bargigli:** piccoli e rossi.

**Faccia:** rossa.

**Orecchioni:** di media grandezza, ovali e di colore bianco celeste.

**Barba:** barba e favoriti, non eccessivi, lasciano parzialmente scoperti bargigli ed orecchioni.

**Ciuffo:** relativamente piccolo, portato dritto e indirizzato verso avanti. Nella gallina leggermente più sviluppato e compatto, però sempre indirizzato in avanti.

**Collo:** lungo, arcuato e portato diritto; mantellina abbondante; nel gallo con lanceolate lunghe e sottili.

**Spalle:** mediamente larghe.

**Ali:** portate ben aderenti al corpo in linea col tronco.

**Coda:** portata alta anche nella gallina. Falciformi scarse e mediamente lunghe. Timoniere portate aperte, specialmente nella gallina.

**Petto:** poco prominente, portato alto.

**Zampe:** gambe moderatamente lunghe, ben evidenti e impiumate. Tarsi di media lunghezza, fini, senza piume, quattro dita.

**Ventre:** ben sviluppato, morbido.

**Pelle:** morbida, bianca.

**Struttura Piumaggio:** ben aderente, penne lunghe ed arrotondate.

**Colorazione Piumaggio:** tutte le colorazioni.

### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- portamento troppo basso o troppo alto;
- tronco debole;
- ciuffo aperto cadente, storto o volto indietro;
- barba non sufficientemente sviluppata;
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba ecc.)

## **23. VALPLATANI**

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Gallina della Val Platani, Valplatani.

**AREA DI ORIGINE:** Regione Sicilia.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Pollo di tipologia mediterranea, rustico e vivace con indole selvatica. Sviluppo relativamente precoce con spiccata attitudine alla deposizione. Buona volatrice.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso Gallo:** 2,0 – 2,5 Kg.

**Peso Gallina:** 1,6 – 1,9 Kg.

**Uovo:** Peso da circa g. 45 sino ad un massimo di circa g. 60 - Colore del guscio: da bianco a brunastro chiaro.

**Misura Anello:** Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.

### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** Cilindrico, non troppo lungo, largo alle spalle si assottiglia e si inclina leggermente verso la coda.

**Testa:** leggermente arrotondata, abbastanza larga, non troppo allungata

**Becco:** non molto forte, di media lunghezza, solo lievemente arcuato; color corno chiaro o striato sulla ranfoteca superiore.

**Occhi:** grandi, vivaci di colore rosso/arancio.

**Cresta:** semplice, rossa, ben sviluppata e ben dritta nel gallo. Cinque/sei denti non eccessivamente profondi, con forma regolare. Il lobo segue la linea della nuca senza avvicinarsi troppo. Nella gallina ammessa leggermente piegata.

**Bargigli:** rossi, abbastanza lunghi, portati ben distesi e senza pieghe.

**Faccia:** rossa con leggera presenza di plumule.

**Orecchioni:** ovali, di media grandezza, lisci e ben aderenti alla faccia e di colore rosso; è tollerata una leggera presenza di bianco.

**Collo:** di media lunghezza, portato eretto con abbondante mantellina che ricade sulle spalle.

**Spalle:** larghe, ben arrotondate, nascoste dalla mantellina.

**Dorso:** largo, medio-corto, portato leggermente rilevato nel gallo, più orizzontale nella gallina.

**Ali:** lunghe e forti, portate mediamente alte ed aderenti al corpo.

**Coda:** di media grandezza con attaccatura larga, portata ben aperta e alta con un angolo, rispetto alla linea del dorso, di 55°-65° nel gallo e 45°-50° nella gallina. Piccole e grandi falciformi non particolarmente abbondanti e mediamente sviluppate e arcuate. Timoniere ben sviluppato e impiumata.

**Petto:** mediamente largo, pieno non troppo arrotondato, portato alto.

**Zampe:** gambe di media lunghezza, ben staccate dal tronco; tarsi mediamente sottili e moderatamente lunghi, di colore blu ardesia, tollerati leggermente salice. 4 dita.

**Ventre:** ben sviluppato e arrotondato, maggiormente nella gallina.

**Pelle:** morbida, grigio - giallastra.

**Struttura Piumaggio:** Abbondante e morbido; ben aderente al corpo senza formare cuscinetti.

**Colorazione Piumaggio:** Selvatica bruna – Dorata frumento - Argentata frumento – Selvatico Argento

## **SELVATICA BRUNA**

**GALLO:** Testa: bruno dorata; mantellina: bruno dorata, che schiarisce leggermente nella parte bassa, con fiamme nere più o meno pronunciate e parzialmente nascoste; dorso: spalle e piccole copritrici delle ali bruno rosso scuro; grandi copritrici delle ali nere con riflessi verde/blu metallici; groppa da bruno rosso a bruno dorato, ammessa la presenza di leggere fiamme nere; remiganti primarie con barbe interne nere e barbe esterne nere con stretta orlatura bruna; remiganti secondarie con barbe interne nere e barbe esterne bruno rosso che formano il triangolo dell'ala; petto, ventre e gambe nere, tollerata la presenza di macchie brune; timoniere nere; grandi falciformi nere con riflessi verde scarabeo; piccole falciformi nere con riflessi verde scarabeo, ammessa la presenza di orlatura bruna. piumino grigio ammesse tracce brune.

**GALLINA:** Testa bruno rosso; mantellina bruno rosso che diventa bruno dorato nella parte terminale con fiamme nerastre; piumaggio in generale bruno ruggine con pepatura nerastra e rachide chiaro, tollerata la presenza di ruggine sulle copritrici delle ali; remiganti primarie con barbe esterne nere con stretta orlatura bruna e barbe interne nere con pepatura bruna; remiganti secondarie con barbe interne nere e barbe esterne bruno ruggine con pepatura nerastra, che forma delle bande trasversali

nerastre non nette; timoniere nere, copritrici bruno ruggine con pepatura nera; petto salmone scuro ,tollerate ai margini sfumature brune; ventre e gambe brune con pepatura grigiastra; piumino grigio.

### **Difetti gravi**

**GALLO:** mantellina, dorso, groppa e spalle troppo chiare; eccessiva presenza di rosso su petto, ventre e gambe.

**GALLINA:** colore di fondo troppo chiaro o troppo scuro, assenza di pepatura, pepatura troppo fine o che forma un disegno a maglie, disegno del rachide totalmente assente, petto troppo chiaro.

### **DORATA FRUMENTO**

**GALLO:** Testa arancio dorata. Mantellina arancio dorata che nella parte terminale diventa più chiara, assenzadi fiamme. Dorso, spalle e copritrici delle ali bruno chiaro brillante. Lanceolate della groppa arancio dorate che nella parte terminale diventano più chiare, assenza di fiamme. Grandi copritrici delle ali nere con riflessi verdi (fascia dell'ala). Remiganti primarie nere con stretto orlo bruno nella parte esterna. Remiganti secondarie nere all'interno e brune all'esterno formano il triangolo dell'ala. Petto nero, leggero disegno brunastro ammesso. Ventre e gambe nere. Coda nera con riflessi verdi, grandi falciformi con orlatura bruna ammessa. Piumino grigio.

**GALLINA:** Testa dorato chiaro. Mantellina bruno dorata, sono ammesse piccole fiamme nero opaco. Piumaggio in generale: frumento. Remiganti primarie frumento. Remiganti secondarie nere all'interno e color frumento all'esterno. Petto, ventre e gambe frumento chiaro. Coda con timoniere nero opaco e con riflessi bruno cuoio, copritrici frumento.

### **Difetti gravi**

**GALLO:** fiamme nere nella mantellina e nelle lanceolate della groppa; bianco nelle ali e nella coda.

**GALLINA:** piumaggio marmorizzato o contacche nere, tonalità frumento troppo scura

### **ARGENTATA FRUMENTO**

**GALLO:** Testa frumento chiaro. Mantellina giallo paglierino con orlatura argentea chiara; fiamme bruno chiaro nella parte inferiore. Dorso, spalle e copritrici delle ali da rosso/arancio carico fino a bruno rossiccio. Lanceolate della groppa gialle con orlatura argentea più chiara, fiamme brune. Grandi copritrici delle ali nere con riflessi verdi (fascia dell'ala). Remiganti primarie nere opache con stretto orlo biancastro nella parte esterna. Remiganti secondarie nere opache all'interno e bianco giallastre all'esterno formano il triangolo dell'ala. Petto nero brillante, un leggero disegno giallastro brunastro è ammesso. Ventre e gambe nere, un leggero disegno giallastro è ammesso. Coda nera con riflessi verdi, nelle grandi falciformi è ammesso un bordo frammisto di bruno/argento.

**GALLINA:** Testa frumento chiaro. Mantellina bruno/oro con orlatura argentea, sono ammesse poche fiamme nero opaco. Piumaggio in generale: frumento chiaro. Remiganti primarie frumento chiaro. Remiganti secondarie nere all'interno e frumento chiaro all'esterno. Petto, ventre e gambe avorio. Coda timoniere grigio nere con sfumature brune; copritrici frumento chiaro.

### **SELVATICO ARGENTO**

**GALLO:** Testa bianco argento. Mantellina bianco argento, ogni piuma con fiamma nera un po' confusa verso l'alto. Groppa bianco argento con disegno a fiamme più o meno netto. Dorso, spalle e



piccole copritrici delle ali bianco argento. Remiganti primarie nere con orlatura bianca nelle barbe esterne. Remiganti secondarie con barbe interne nere e barbe esterne bianche che formano il triangolo dell'ala bianco puro. Fasce dell'ala nere a riflessi verdi. Petto nero a riflessi verdi. Ventre e gambe nere. Timoniere nere. Grandi e piccole falciformi nere con riflessi verdi.

**GALLINA:** Testa bianco argento. Mantellina bianco argento con fiamme nerastre. Piumaggio del mantello grigio argento con fine pepatura nera e rachide delle piume bianco, il più possibile senza bordo chiaro sulle piume. Petto color salmone che passa al grigio verso le gambe ed il ventre. Timoniere nere, copritrici della coda grigie con pepatura nera. Piumino grigio chiaro nei due sessi.

### **Difetti gravi**

**GALLO:** riflessi gialli; assenza di fiamme o fiamme che sfondano; triangolo dell'ala incompleto; disegno bianco nel petto; forte disegno bianco sulle gambe e sul ventre; riflessi violetti sulle falciformi.

**GALLINA:** riflessi bruni; fiamme assenti o che sfondano nella mantellina; piumaggio del mantello troppo chiaro o troppo scuro; pepatura raggruppata o a macchie; orlatura chiara; molta ruggine sulle ali.

### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- Ali a forbice,
- cresca cadente nei galli o con colpo di pollice.
- Occhio chiaro,
- pupilla irregolare.

## **24. VAL D'ULTIMO O PROVES.**

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Gallina della Val d'Ultimo o Proves.

**AREA DI ORIGINE:** Regione Trentino-Alto Adige.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Pollo di tipo campagnolo di media mole, dal portamento medio alto, coda portata abbastanza alta e piumaggio ben serrato al corpo.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso Gallo:** 2,0 – 2,5 Kg.

**Peso Gallina:** 1,7 – 2,0 Kg

**Uovo:** Peso da circa g. 55 - Colore del guscio: da bianco a brunastro chiaro.

**Misura Anello:** Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.

### **CARATTERI TIPICI:**

**Testa:** larga e forte.

**Becco:** forte, da nero a blu ardesia chiaro con apice scuro

**Occhi:** occhi con iride rosso fino a bruno scuro.

**Cresta:** Cresta semplice, dritta e di media grandezza; dentellatura non troppo profonda; lobo ben sviluppato che segue la linea della nuca senza appoggiarvisi. Nella gallina medio piccola; può essere piegata da un lato, nella parte posteriore che si piega ora da una parte poi dall'altra.

**Bargigli:** di media lunghezza e ben arrotondati.

**Faccia:** Faccia rossa con qualche piccolissima piuma.

**Orecchioni:** Orecchioni di media grandezza; ellittici, bianco puro

**Collo:** Medio mantellina abbondante.

**Spalle:** larghe.

**Dorso:** di media lunghezza che si restringe un po' verso la coda. Groppa con abbondante piumaggio

**Ali:** lunghe, portate alte e ben serrate al corpo.

**Coda:** riccamente sviluppata che forma un angolo ma portata piuttosto alta; numerose falciformi. Nella gallina portata aperta o semi aperta

**Petto:** largo, pieno e portato basso.

**Zampe:** Cosce forti e leggermente divaricate. Tarsi di media lunghezza; colore grigio piombo. Dita ben conformate e lunghe.

**Ventre:** Ventre pieno e profondo

**Pelle:** morbida, grigio - giallastra.

**Struttura Piumaggio:** Il piumaggio è ben sviluppato, formato da piume larghe e soffici.

**Colorazione Piumaggio:** Bianco – Selvatico Oro - Selvatico Oro Macchiettato - Selvatica Melanizzata – Selvatico Arancio – Selvatico Limone – Selvatico Argento – Dorata Frumento - Perniciata Oro A Maglie Nere.

## **BIANCO**

### **GALLO e GALLINA**

Piumaggio bianco purissimo, più lucente nel gallo. Può assumere a volte alcuni riflessi dorati, accentuati dall'alimentazione e dalla stabulazione. Piumino bianco. Difetti gravi: riflessi paglia eccessivi, penne di altro colore.

## **SELVATICO ORO**

### **GALLO**

Testa giallo oro. Mantellina sia giallo oro più chiara nella parte terminale sia oro uniforme, con fiamme nere. Dorso, spalle e copritrici delle ali rosso scuro brillante. Lanceolate della groppa giallo

oro, con fiamme nere. Grandi copritrici delle ali nere con riflessi blu/verde metallici. Remiganti primarie nere, con stretto bordo bruno nella parte esterna. Remiganti secondarie con parte interna e punta nere, parte esterna bruna che forma il triangolo dell'ala. Petto nero a riflessi verdi senza tracce di bruno. Ventre e gambe nere. Coda: nera con forti riflessi verdi. Piumino grigiastro.

### **GALLINA**

Testa gialla oro. Mantellina giallo oro con fiamme nere. Il piumaggio in generale è oro bruno con pepatura grossolana nera, rachide leggermente più chiara presente (tale accentuazione sfiora nella colorazione selvatico bruna). Remiganti primarie nere con stretto bordo esterno bruno pepato. Remiganti secondarie con parte interna nera e parte esterna bruno pepata. Petto salmone. Ventre e gambe grigio/bruno. Coda nera, le due grandi copritrici superiori disegnate come il resto del piumaggio.

### **SELVATICO ORO MACCHIETTATO**

#### **GALLO**

Testa bruno dorata. Mantellina bruno dorata che vira al giallo oro nella parte terminale. Alcune penne in percentuale variabile sono macchiate di bianco. Dorso, spalle e piccole copritrici delle ali sono bruno rosso scuro, groppa bruno rosso fino a bruno dorato. Lanceolate della groppa giallo oro, con fiamme nere terminanti in macchie bianche più o meno regolari. Grandi copritrici delle ali nere con riflessi blu/verde metallici. Remiganti primarie nere, con stretto bordo bruno nella parte esterna. Remiganti secondarie con parte interna e punta nere, parte esterna bruna che forma il triangolo dell'ala. Qualche remigante interamente bianca può essere presente. Petto, gambe e ventre nero a riflessi verdi senza tracce di bruno. Nella coda sia le timoniere che le falciformi sono nere con forti riflessi verdi. La maggior parte delle piume mostra un disegno simile alla varietà millefiori con colore di fondo mogano. Nel complesso il disegno appare poco omogeneo e regolare; l'estremità bianca delle penne risulta sovente più grande. Piumino grigiastro.

#### **GALLINA**

Testa bruno intenso. Mantellina bruno intenso che diventa bruno dorato nella parte terminale con fiamme nere. Il piumaggio in generale è oro bruno, con pepatura nerastra e rachide leggermente più chiaro. La presenza di tracce mogano nelle copritrici delle ali è abbastanza sovente. Remiganti primarie con barbe esterne nere con orlatura bruna e barbe interne nere con pepatura bruna. Remiganti secondarie con barbe interne nere e barbe esterne bruno mogano con pepatura che forma bande trasversali. Petto salmone scuro rossastro indefinito. Ventre e gambe grigio bruno. Coda nera, le due grandi copritrici superiori disegnate come il resto del piumaggio. Il disegno ricorda quello della varietà millefiori, con colore di fondo bruno, paillette nera e parte terminale una perla bianca, ma è meno regolare e meno nettamente delimitato.

### **SELVATICA MELANIZZATA**

#### **GALLO**

testa, mantellina e groppa rosso/bruno con fiamme nere. Piccole copritrici delle ali e dorso rosso/bruno scuro. Remiganti primarie nere, con orlatura bruna sulla parte esterna. Remiganti secondarie con barbe interne nere; barbe esterne brune che formano il triangolo dell'ala. Fasce dell'ala nere; petto, addome e gambe nere.

#### **GALLINA**

testa e piumaggio del collo bruno dorato spesso quasi nero nella nuca con fiamme nere. Petto salmone. Piumaggio del mantello bruno con pepatura nera, rachide bruno chiaro e orlatura nerastra più o meno

marcata. Gambe grigio/bruno. Addome grigio/nero. Iride di colore rosso/aranciato. **Nota:** E' possibile rilevare la variante macchiettata su questa colorazione.

## **SELVATICO ARANCIO**

### **GALLO**

Testa arancione. Mantellina arancio chiaro con fiamme nere. Dorso, spalle e copritrici delle ali arancio scuro/rosso. Lanceolate della groppa arancio chiaro con fiamme nere a riflessi verdi. Grandi copritrici delle ali nere con riflessi verde/blu metallici. Remiganti primarie nere, con stretto bordo bianco/giallastro nella parte esterna. Remiganti secondarie con parte interna e punta nere, parte esterna crema che sfuma verso l'esterno in bruno e forma il triangolo dell'ala. Petto nero a riflessi verdi senza tracce di arancio. Ventre e gambe nere. Coda nera a riflessi verdi. Piumino grigiastro.

### **GALLINA**

Testa giallo/arancio chiaro. Mantellina giallo/arancio chiaro con fiamme nere. Piumaggio in generale: bruno chiaro con fine pepatura nera regolarmente distribuita; rachide arancio chiaro ammessa ma sgradita. Remiganti primarie nere con stretto bordo esterno bruno chiaro pepato. Remiganti secondarie con parte interna nera e parte esterna bruno chiaro pepato. Petto salmone. Gambe e ventre grigie. Coda nera, le due grandi copritrici superiori disegnate come il resto del piumaggio. **Nota:** E' possibile rilevare la variante macchiettata su questa colorazione.

## **SELVATICO LIMONE**

### **GALLO**

Testa limone. Mantellina limone chiaro con fiamme nere. Dorso, spalle e copritrici delle ali limone scuro/rosso. Lanceolate della groppa limone chiaro con fiamme nere a riflessi verdi. Grandi copritrici delle ali nere con riflessi verde/blu metallici. Remiganti primarie nere, con stretto bordo bianco/giallastro nella parte esterna. Remiganti secondarie con parte interna e punta nere, parte esterna crema che sfuma verso l'esterno in bruno e forma il triangolo dell'ala. Petto nero a riflessi verdi senza tracce di arancio. Ventre e gambe nere. Coda nera a riflessi verdi. Piumino grigiastro.

### **GALLINA**

Testa limone chiaro. Mantellina limone chiaro con fiamme nere. Piumaggio in generale: bruno chiaro con fine pepatura nera regolarmente distribuita; rachide limone chiaro. Remiganti primarie nere con stretto bordo esterno bruno chiaro pepato. Remiganti secondarie con parte interna nera e parte esterna bruno chiaro pepato. Petto salmone. Gambe e ventre grigie. Coda nera, le due grandi copritrici superiori disegnate come il resto del piumaggio. **Nota:** E' possibile rilevare la variante macchiettata su questa colorazione.

## **SELVATICO ARGENTO**

### **GALLO**

Testa bianco argento. Mantellina bianco argento con fiamme nere. Dorso, spalle e copritrici delle ali bianco-argento. Lanceolate della groppa bianco argento con fiamme nere a riflessi verdi. Grandi copritrici delle ali nere con riflessi verde/blu metallici. Remiganti primarie nere, con stretto orlo bianco nella parte esterna. Remiganti secondarie con parte interna e punta nere, parte esterna bianca che forma il triangolo dell'ala bianco puro. Petto nero a riflessi verdi senza tracce di bianco. Ventre e gambe nere. Coda nera con forti riflessi verdi. Piumino grigiastro.

### **GALLINA**

Testa bianco argento. Mantellina bianco argento con fiamme nere. Piumaggio in generale grigio

argento con fine pepatura nera regolarmente distribuita; rachide bianca ammessa ma mai eccessiva. Remiganti primarie nere con stretto bordo esterno bianco argento pepato. Remiganti secondarie con parte interna nera e parte esterna argento pepata. Petto salmone. Ventre e gambe grigie. Coda nera, le due grandi copritrici superiori disegnate come il resto del piumaggio.

## **DORATA FRUMENTO**

### **GALLO**

Testa bruno rosso. Mantellina e groppa bruno dorato. La mantellina, priva di fiamme nere, verso la testa e la groppa sono più scure per poi schiarire verso il basso. Dorso, spalle e piccole copritrici delle ali bruno castagna. Fasce dell'ala nere a riflessi verde brillante. Remiganti primarie nerastre. Remiganti secondarie nerastre all'interno, brune all'esterno che formano il triangolo dell'ala. Petto, ventre e gambe sono da ricercare nere con riflessi verdi. Coda nera con riflessi verdi.

### **GALLINA**

Testa color frumento fino a nocciola. Mantellina bruno dorato sostenuto, qualche fiamma nero opaco è tollerata. Petto color frumento. Ventre e gambe color frumento nocciola. Dorso e resto del mantello color fromentino. Triangolo dell'ala un po' più scuro. Nero ammesso nelle barbe interne delle remiganti. Timoniere grigio nero velati di bruno. Copritrici della coda color frumento. Tono un po' più scuro nell'insieme è ammesso. **Nota:** E' possibile rilevare la variante macchiettata su questa colorazione.

## **PERNICIATA ORO A MAGLIE NERE**

### **GALLO**

Testa bruno dorata. Mantellina bruno dorata con fiamma nera a riflessi verdi che presenta al centro una "lancia" dorata. Dorso, spalle e copritrici delle ali rosso carminio. Lanceolate della groppa bruno dorate con fiamme nere che presentano al centro una "lancia" dorata. Grandi copritrici delle ali nere con riflessi verdi (fascia dell'ala nera). Remiganti primarie nere con margine esterno bruno. Remiganti secondarie nere all'interno e bruno dorate all'esterno formano il triangolo dell'ala bruno. Petto nero con piccole orlature brune all'apice delle penne. Ventre e gambe neri con piccole orlature brune. Coda nera con riflessi verdi. Piumino grigio.

### **GALLINA**

Testa: bruno dorata. Mantellina bruno dorata con fiamme nere, la penna termina con un ampio orlo dorato. Piumaggio in generale bruno dorato uniforme con disegni neri poco nitidi che seguono la forma della penna. Remiganti primarie nere con brizzolature brune nella parte esterna. Remiganti secondarie nere all'interno e brune con disegno a bande all'esterno. Coda nera.

## **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba ecc.)

## 25. NOSTRANA DI MOROZZO

**AREA DI ORIGINE:** Italia del nord Ovest, Piemonte, più precisamente nell'areale del Cuneese nei territori limitrofi al comune di Morozzo, dal quale prende il nome.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Pollo ruspante, vivace e dalla forma raccolta e robusta. Rustico, precoce, dall'elevata capacità di deposizione, spesso utilizzato per la capponatura. E' presente intensa pigmentazione gialla della pelle e dei tarsi, con creste e bargigli molto sviluppati.

### DATI BIOMETRICI

**Peso Gallo:** Kg 2,5 – 2,8

**Peso Gallina:** Kg 2,0 – 2,3

**Uovo:** Peso minimo 55 grammi – **Colorazione del guscio:** da bianco crema a rosato

**Misura Anello:** Gallo: 18mm, Gallina: 16 mm

### CARATTERI TIPICI

**Tronco:** largo, di media lunghezza, profondo e molto compatto, soprattutto nella gallina. Portamento orizzontale.

**Testa:** di media grandezza, proporzionata.

**Becco:** forte, leggermente arcuato, da giallo a color corno.

**Occhi:** grandi e vivaci, da giallo intenso a rosso/arancio.

**Cresta:** semplice, il più sviluppata possibile e robusta, rossa, da 4 a 6 denti, il lobo segue la linea della nuca, appoggiandosi. Dritta nel gallo, è tollerata leggermente piegata nella parte posteriore (a causa del peso e del volume da ricercare), nella gallina è piegata da un lato, non necessariamente dopo il secondo dente, andando a ricoprire l'occhio. Tessitura grossolana. Tollerata la presenza di colpi di pollice.

**Bargigli:** molto grandi, lunghi e pendenti, rossi intensi, tollerati aperti a farfalla.

**Faccia:** rossa, liscia.

**Orecchioni:** di media grandezza e ben visibili, allungati, da bianco crema a gialli.

**Collo:** di media lunghezza, ben arcuato, con ricca mantellina.

**Spalle:** larghe ed arrotondate.

**Dorso:** largo, medio/corto, portato orizzontale, appena rilevato nel gallo. Lanceolate della groppa del gallo ben sviluppate.

**Ali:** forti, portate orizzontali o appena inclinate ed aderenti al corpo.

**Coda:** di lunghezza media, portata mediamente aperta, molto rilevata; l'angolazione minima con la linea del dorso è di 65/70° nel gallo e di 60° nella gallina; nel gallo falciformi di media lunghezza, ben ricurve.

**Petto:** pieno, largo ed arrotondato, profondo.

**Zampe:** gambe molto carnose, nella gallina nascoste dal piumaggio dei fianchi; nel gallo sono poco visibili; tarsi di media lunghezza, giallo intenso. Quattro dita.

**Ventre:** pieno e ben arrotondato. Nelle galline adulte più sviluppato.

**Pelle:** color giallo intenso, nella gallina in deposizione è ammessa un po' più chiara.

**Struttura Piumaggio:** Folto e ben aderente al corpo, con ricca mantellina.

### **Colorazioni Piumaggio - SELVATICA BRUNA TESTA DI MORO**

**GALLO:** Testa rosso bruno scuro; mantellina bruno rosso con fiamme nere più o meno pronunciate, che diventa bruno dorato nella parte bassa; dorso, spalle e piccole copritrici delle ali bruno rosso scuro; grandi copritrici delle ali nere con riflessi verde/blu metallici; groppa da bruno rosso a bruno dorato, ammessa la presenza di leggere fiamme nere; remiganti primarie con barbe interne nere e barbe esterne nere con stretta orlatura bruna; remiganti secondarie con barbe interne nere e barbe esterne bruno rosso che formano il triangolo dell'ala; petto, ventre e gambe nere, tollerata la presenza di leggere tracce brune; timoniere nere; grandi falciformi nere con riflessi verde scarabeo; piccole falciformi nere con riflessi verde scarabeo, ammessa la presenza di orlatura bruna; piumino grigio.

**GALLINA:** Testa nera; parte alta della mantellina nera, nella parte bassa le piume sono nere con una leggera orlatura bruno dorata che diventa via via più larga; piumaggio in generale bruno con pepatura nerastra e rachide chiaro; tollerata la presenza di ruggine sulle copritrici delle ali; remiganti primarie con barbe esterne nere con stretta orlatura bruna e barbe interne nere con pepatura bruna; remiganti secondarie con barbe interne nere e barbe esterne bruno ruggine con pepatura nerastra, che forma delle barre trasversali nerastre non nette; timoniere nere, copritrici bruno ruggine con pepatura nera; petto salmone scuro, tollerate ai margini sfumature brune; ventre e gambe brune con pepatura grigiastra; piumino grigio.

### **Difetti Gravi**

**Gallo:** mantellina, dorso, groppa e spalle troppo chiare; eccessiva presenza di rosso su petto, ventre e gambe, molto bianco nel piumaggio.

**Gallina:** colore di fondo troppo chiaro o troppo scuro, assenza di pepatura, troppo fine o che forma un disegno a maglie troppo evidente, disegno del rachide totalmente assente, petto troppo chiaro.

### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO**

Portamento troppo rilevato; struttura debole e troppo esile; corpo allungato; petto piatto; coda portata troppo bassa e chiusa; zampe e tarsi troppo lunghi; eccessiva presenza di rosso negli orecchioni.

## 26. CORNUTA DI CALTANISSETTA

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Cornuta di Sicilia, Cornutella, Gallina Corna di bue

**AREA DI ORIGINE:** Regione Sicilia.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Pollo vivace e schivo, molto precoce e con spiccata attitudine alla deposizione. E' caratterizzato dalla tipica cresta a cornetti che si associa a delle narici cavernose. Il piumaggio è abbondante e aderente al corpo.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso Gallo:** 1,6 – 2,5 Kg

**Peso Gallina:** 1,2 – 2,0 Kg

**Uovo:** Peso minimo 45 grammi - **Colorazione guscio:** dal bianco al brunastro chiaro.

**Misura Anello:** Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.

### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** cilindrico, non troppo allungato.

**Testa:** di media grandezza e lunghezza, abbastanza profonda.

**Becco:** non molto forte, di media lunghezza, solo leggermente arcuato; da giallo a corno scuro. ammessa una piccola escrescenza carnosa nella parte anteriore.

**Occhi:** rotondi e prominenti rosso brunastri.

**Cresta:** rossa, composta da una caruncola, bassa e stretta, che parte dalle narici e si sviluppa posteriormente, dividendosi, dopo un paio di centimetri, in due cornetti di dimensioni medio/grandi, di forma conica ed il più simmetrici possibile, per dimensioni e direzione, tra loro; tollerati leggermente schiacciati o asimmetrici.

**Bargigli:** rossi, lunghi e portati ben distesi.

**Faccia:** rossa, liscia, di tessitura fine e morbida.

**Orecchioni:** di media grandezza, rossi, è tollerata una leggera presenza di bianco, piatti, lisci ben aderenti alla testa.

**Collo:** ben arcuato; Mantellina abbondante.

**Spalle:** Larghe, ben arrotondate, nascoste dalla mantellina.

**Dorso:** largo, medio/corto, portato leggermente rilevato nel gallo, più orizzontale nella gallina.



**Ali:** larghe, ben chiuse e portate serrate al corpo. Remiganti primarie e secondarie larghe e ben soprammesse in ordine naturale quando l'ala è chiusa.

**Coda:** moderatamente larga, ben aperta; portata con un angolo alto superiore ai 60° con l'orizzontale; timoniere lunghe, falciformi lunghe e ben ricurve; abbondanti copritrici.

**Petto:** largo, pieno e prominente.

**Zampe:** di media lunghezza ben divaricate e dritte quando viste di fronte. Tarsi di media lunghezza. Quattro dita di media lunghezza e ben aperte.

**Ventre:** moderatamente sviluppato.

**Struttura Piumaggio:** Abbondante e morbido; ben aderente al corpo senza formare cuscinetti. -

**Colorazione Piumaggio:** Selvatica bruna

### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

Coda portata troppo bassa, cornetti ramificati, narici asimmetriche, cresta scarsamente sviluppata, orecchioni troppo bianchi, cornetti poco sviluppati.

## **Specie Faraona (Numida Meleagris):**

- 1. AZZURRA DI GHIGI (STANDARD NON DISPONIBILE);**
- 2. BIANCA ALBINA (STANDARD NON DISPONIBILE);**
- 3. BLUETTA (STANDARD NON DISPONIBILE);**
- 4. CAMOSCIATA;**
- 5. FULVETTA (STANDARD NON DISPONIBILE)**
- 6. GRIGIA COMUNE (STANDARD NON DISPONIBILE)**
- 7. LILLA O GRIGIO PERLA (STANDARD NON DISPONIBILE)**

### **4. CAMOSCIATA**

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Faraona Camosciata.

**AREA DI ORIGINE:** Regione Veneto.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Razza di mole ridotta che si contraddistingue per l'elevata produzione di uova.

#### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio del maschio alla maturità:** 1,6-1,9 kg.

**Peso medio della femmina alla maturità:** 1,6 – 1,9 kg.

**Uovo:** Peso medio 45 grammi. **Colorazione guscio:** dall'avorio al bruno.

#### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** largo, ben arrotondato e fortemente convesso.

**Testa:** corta, larga, ornata dall'elmo a forma di triangolo con punta piegata all'indietro.

**Becco:** forte e ben arcuato. Di colore corneo.

**Occhi:** grandi, brillanti. Di colore bruno scuro.

**Elmo:** escrescenza ossea di forma triangolare, da bruno a rosso. Nella femmina è più smussato quindi meno sviluppato mentre nel maschio è più largo alla base e più curvato all'indietro.

**Bargigli:** ben distanziati, spessi, di forma triangolare o romboidale, rossi, con la faccia interna bianca. Nel maschio si potrebbero definire accartocciati in avanti, a forma di cucchiaino. Nella femmina i bargigli sono piatti ed aderenti alla faccia.

**Faccia:** di colore bianco bluastrò.

**Orecchioni:** formano un tutt'uno con la faccia, da bianco a blu, poco distinguibili.

**Collo:** in prossimità della testa è sottile, bluastrò e nudo, ornato da setole scure. Generalmente è portato represso, solo quando è in stato di eccitazione il maschio lo allunga.

**Spalle:** larghe e ben arrotondate.

**Dorso:** molto largo e arcuato.

**Ali:** lunghe e larghe, portate ben aderenti al corpo.

**Coda:** corta, portata chiusa e cadente.

**Petto:** portato alto, nel maschio è più appuntito, mentre nella femmina è più arrotondato.

**Zampe:** corte e nascoste dal piumaggio; tarsi fini, abbastanza corti, senza speroni, quattro dita. Tarsi il colore può essere da grigio chiaro ad arancio pallido.

**Cosce:** sviluppate e muscolatura ben pronunciata.

**Ventre:** poco sviluppato.

**Pelle:** Morbida, di colore variabile grigio chiaro.

**Struttura Piumaggio:** abbondante e sufficientemente morbido. La parte superiore del collo è ricoperta da alcune piume simili a dei peli; la base invece è ricca di penne corte.

**Colorazione Piumaggio:** colore di fondo camoscio più o meno pallido sul quale spicca la perlatura. Il maschio presenta una tonalità più chiara della femmina.

#### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- mancanza di simmetria nei bargigli;

- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.);
- colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche.

## **Specie Anatra (Anas platyrhynchos):**

- 1. MIGNON;**
- 2. GERMANATA VENETA**
- 3. ROMAGNOLA (STANDARD NON DISPONIBILE);**

### **1. MIGNON.**

**AREA DI ORIGINE:** Regione Veneto.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Razza di taglia ridotta, rustica particolarmente adatta all'allevamento all'aperto.

#### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio del maschio alla maturità:** 1,1 kg.

**Peso medio della femmina alla maturità:** 1,0 kg.

**Uovo:** Peso medio 45-50 grammi. Colorazione guscio: bianco

#### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** corto, compatto e ben arrotondato.

**Testa:** grande in rapporto al corpo, ben arrotondata, fronte alta e bombata.

**Becco:** corto e largo, leggermente concavo; di colore giallo.

**Occhi:** vivaci, di colore bruno.

**Faccia:** guance ben sviluppate e grandi.

**Collo:** corto, leggermente arcuato.

**Spalle:** larghe e arrotondate.

**Dorso:** corto, largo, un po' bombato, portato leggermente inclinato verso la coda.

**Ali:** lunghe, portate alte chiuse.

**Coda:** corta, chiusa, che segue la linea del dorso, alla maturità nel maschio deve essere presente un ricciolo sul codone.

**Petto:** pieno, ben arrotondato, prominente, portato alto.

**Zampe:** corte, nascoste nel piumaggio dei fianchi; tarsi corti e sottili. Zampe di colore giallo-arancio.

**Cosce:** abbastanza sviluppate.

**Ventre:** piatto, senza chiglia.

**Pelle:** morbida e giallastra.

**Struttura Piumaggio:** teso, ben aderente, piumino abbondante.

**Colorazione Piumaggio:** Mantello di colore bianco candido.

### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.)
- tarsi con colorazione diversa da giallo-arancio;
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

## **2. GERMANATA VENETA**

**AREA DI ORIGINE:** Regione Veneto.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Razza dal carattere pacifico e mansueto, animale rustico che si adatta molto bene all'allevamento libero.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio del maschio alla maturità:** 2,5 kg.

**Peso medio della femmina alla maturità:** 2,3 kg.

**Uovo:** Peso medio 70 grammi. **Colorazione guscio:** bianco.

### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** lunghezza media, leggermente inclinato, forte e carnoso; la parte inferiore senza chiglia;

**Testa:** ovale, forte e piatta.

**Becco:** forte, largo e diritto. Nel maschio di colore verde giallastro con unghiata nera; nella femmina arancio scuro; unghiata scura.

**Occhi:** vivaci, di colore bruno.

**Collo:** lungo leggermente arcuato.

**Spalle:** larghe e leggermente arrotondate.

**Dorso:** largo, arrotondato e portato leggermente inclinato verso la coda.

**Ali:** ben aderenti.

**Coda:** di media grandezza, che segue la linea del dorso.

**Petto:** largo e carnoso.

**Zampe:** appena evidenti; tarsi di media lunghezza, arancioni; un po' più chiari nella femmina.

**Ventre:** largo, ben sviluppato.

**Pelle** morbida e bianco giallastra.

**Struttura Piumaggio:** liscio, con molto piumino.

**Colorazione Piumaggio:**

## **MASCHIO**

Testa e collo: Verde profondo e brillante. Parte inferiore del collo e petto: da ruggine a bruno rossastro. Queste due parti sono divise da un anello bianco, aperto, alto circa 1 cm. Dorso: parte alta grigio cenere mescolato a nero con riflessi verdi. Sella e parte bassa del dorso: nero intenso con forti riflessi verdi. Fianchi: grigio perla senza tracce brune Coda: bruno cenere scuro, penne esterne con margine bianco che diminuisce di larghezza nelle interne; copritrici nere con riflessi più chiari. Ricciolo bruno. Ali: piccole copritrici grigio ardesia che schiarisce in grigio chiaro verso l'esterno grandi copritrici grigio ardesia con striscia bianca ed orlo nero che formano la fascia dell'ala. Remiganti secondarie grigio ardesia, nella parte esterna c'è una larga banda blu iridescente, una striscia nera per poi terminare con una striscia bianca, si forma così lo specchio dell'ala; remiganti primarie ardesia brunastro. Sotto ala bianco. Ventre: grigio acciaio finemente disegnato da linee ondulate scure, il tono del colore si schiarisce gradatamente.

## **FEMMINA**

Testa: bruno scuro composto da un tono bruno scuro mischiato ad un tono bruno chiaro; linea oculare, che dalla fronte passa sopra l'occhio fino alla fine della nuca, bruno più scuro. Collo: parte posteriore come la testa solo un po' più chiara, parte anteriore bruno giallastra regolarmente e distintamente orlata di bruno scuro. Dorso, Fianchi e Ali: bruno scuro, ogni penna ha un disegno a maglie multiple bruno nerastro a forma di ferro di cavallo. Remiganti primarie, secondarie: come nel maschio. Coda: timoniere e copritrici un po' più chiare, regolarmente e distintamente orlate di bruno scuro. Petto e Ventre: leggermente più chiaro del dorso, ma ugualmente disegnato

## **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- Evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.)
- Colorazione marcatamente diversa da quella tipica;

### **nel maschio:**

- mancanza o larghezza eccessiva dell'anello bianco;
- anello chiuso.
- sulla testa verde presenza di piume o piumino marrone

### **nella femmina:**

- *macchie bianche sul ventre.*

## **Specie Anatra (Chairina Moscata):**

## 1. MUTA O DI BARBERIA (STANDARD NON DISPONIBILE);

### Specie Oca (*Anser anser*)

1. PADOVANA;
2. PEZZATA VENETA (STANDARD NON DISPONIBILE);
3. ROMAGNOLA.

#### 1. PADOVANA

**AREA DI ORIGINE:** Regione Veneto.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Razza dotata di buona attitudine alla deposizione.

#### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso del maschio alla maturità:** 6,0-8,0 kg.

**Peso della femmina alla maturità:** 5,0-7,0 kg.

**Uovo:** Peso medio 140 grammi. Colorazione guscio: bianco.

#### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** contorni arrotondati; forma armoniosa e regolare. Portamento leggermente in discesa, più accentuato nel maschio.

**Testa:** non troppo piccola, ma di media grandezza comunque ben proporzionata, che si restringe all'attaccatura del becco.

**Becco:** Forte, alto all'attaccatura. Più corto della larghezza della testa. Unghiata leggermente piegata ad uncino. Colore giallo/arancio, con unghia rosata.

**Occhi:** bruni con caruncole oculari rosso/arancio.

**Faccia:** guance abbastanza sviluppate.

**Collo:** cilindrico, piuttosto lungo; un po' più corto e affusolato nella femmina, che si irrobustisce verso l'attaccatura col tronco.

**Spalle:** larghe.

**Dorso:** largo e non troppo arrotondato.

**Ali:** ben serrate al corpo e parallele fra loro, abbastanza lunghe ma senza oltrepassare la coda.

**Coda:** Abbastanza corta che continua la linea del dorso formando all'attaccatura un leggerissimo angolo. Grigia con margine bianco.

**Petto:** largo, pieno e profondo.

**Zampe:** di media grandezza, nascoste dal piumaggio dei fianchi. Tarsi non troppo lunghi e ben proporzionati; colore da giallo/arancio a rosei (color carnicino).

**Ventre:** largo abbondante e con fanone molto sviluppato, da grigio chiaro a bianco.

**Pelle:** biancastra.

**Struttura Piumaggio:** abbondante e ben serrato al corpo, più leggero nella parte inferiore.

**Colorazione Piumaggio:**

**Mantello:** grigio scuro brunastro con all'estremità delle penne una fine orlatura bianca. Piumino grigio biancastro.

- **Collo:** parte anteriore più chiara.
- **Coda:** grigia con margine bianco
- **Ventre:** grigio chiaro fino a bianco.

**CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- becco basso all'attaccatura;
- presenza di giogaia;
- fanone singolo;
- presenza del colore bianco nelle remiganti;
- disegno molto impreciso;
- Evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.)
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

## **2. PEZZATA VENETA (non disponibile);**

## **3. ROMAGNOLA**

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Oca di Roma, Oca Cotignola, Oca italiana.

**AREA DI ORIGINE:** Regione Emilia Romagna.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Razza di taglia piccola si contraddistingue per essere un animale piuttosto voluminoso, elegante, armonioso nelle sue parti. Apprezzata per l'ottima attitudine alla deposizione delle uova.

**DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio gallo alla maturità:** 5,5-6,5 kg.

**Peso medio gallina alla maturità:** 4,5-5,5 kg.

**Uovo:** Peso medio 120 grammi. Colorazione guscio: bianco. Tasso di deposizione: 110-120 uova/anno. **Misura Anello:** Maschio 24 mm, Femmina 24 mm.

**CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** largo, profondo leggermente inclinato verso dietro.

**Testa:** larga, arrotondata, ben proporzionata. Può presentare un piccolo ciuffo. Guance poco sviluppate.

**Becco:** di media lunghezza, largo, forte, attaccato alto. Colore da rosato ad arancio/rossastro con unghia rosa/biancastra.

**Occhi:** rotondi, di colore grigio chiaro con caruncola oculare rosso/arancio.

**Collo:** forte e molto lungo, cilindrico; più robusto verso l'attaccatura al tronco, portamento elegante.

**Dorso:** ben arrotondato, pieno e largo. Nel maschio leggermente inclinato verso la coda.

**Ali:** grandi e lunghe, portate alte, parallele e ben aderenti al corpo.

**Coda:** corta, leggermente alzata e arrotondata all'estremità.

**Petto:** profondo, largo, ben arrotondato, piuttosto basso, senza chiglia.

**Zampe:** gambe muscolose, ben sviluppate, posizionate larghe e ben in appiombio, ricoperte dal piumaggio dei fianchi; tarsi piuttosto corti di ossatura piuttosto fine, colore da arancio ad arancio/rosato.

**Ventre:** lungo, largo, senza fanone. Ammesso fanone semplice, leggermente discendente, poco sviluppato nei soggetti giovani.

**Pelle:** biancastra.

**Struttura Piumaggio:** Penne larghe, arrotondate, con abbondante piumino. Lucente, ben rigido e serrato al corpo nella parte superiore e più fitto ed abbondante nella parte inferiore.

**Colorazione Piumaggio:** Piumaggio di colore bianco puro e piumino bianco.

#### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- peso eccessivo, soggetti troppo grassi;
- giogaia o chiglia pronunciata;
- ali che si incrociano;
- ali rovesciate;
- presenza del doppio fanone;
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica;
- presenza di qualsiasi macchia di colore, di riflessi.
- giallastri, di piumino grigio.

#### **Specie Tacchino (*Meleagris gallopavo*):**

- 1. BRIANZOLO (STANDARD NON DISPONIBILE);**
- 2. BRONZATO COMUNE;**
- 3. BRONZATO DEI COLLI EUGANEI (STANDARD NON DISPONIBILE);**
- 4. CASTANO PRECOCE;**
- 5. ERMELLINATO DI ROVIGO;**
- 6. ROMAGNOLO;**
- 7. NERO D'ITALIA (STANDARD NON DISPONIBILE);**
- 8. TACCHINO DI PARMA E PIACENZA;**



## 1. BRIANZOLO (standard non disponibile)

## 2. BRONZATO COMUNE

**AREA DI ORIGINE:** Regione Veneto.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** razza di taglia leggera con elevata rusticità e spiccata attitudine alla cova. Buona qualità della carne.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio del maschio alla maturità:** 6,0-7,0 kg.

**Peso medio della femmina alla maturità:** 3,0-3,5 kg.

**Uovo:** Peso medio 70-85 grammi. Colorazione guscio: avorio con punteggiatura marrone.

### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** allungato, forte, largo, si restringe verso la groppa.

**Testa:** caratteristica per le caruncole, per una protuberanza carnosa sopra il becco ed un bargiglio unico sotto la gola. La testa è nuda nel maschio, leggermente impiumata nella femmina.

**Becco:** lungo e forte, leggermente ricurvo, color corneo;

**Occhi:** brillanti; grandi; iride scura.

**Faccia:** nuda, rosso bluastra.

**Verruche:** sono presenti su tutta la faccia, sulle parti non impiumate del collo e sono di colore rosso.

**Collo:** di lunghezza media; leggermente arcuato; parte superiore guarnita di caruncole di colore bluastrò che diventano rosse quando l'animale è eccitato.

**Spalle:** molto larghe.

**Dorso:** Lungo, largo davanti, leggermente convesso ed inclinato verso la groppa.

**Ali:** lunghe; larghe; portate ben chiuse ed aderenti.

**Coda:** lunga; larga, portata chiusa ed inclinata a seguire la linea del dorso quando è a riposo, aperta a ventaglio quando è eccitato.

**Petto:** molto largo, pieno, ben arrotondato, portato mediamente alto. La parte superiore del petto è caratterizzata da un ornamento centrale costituito da un insieme di setole nere che formano un "ciuffo" o "pennello" lungo anche 15 cm nei maschi. Spesso, nei soggetti giovani, è nascosto dal piumaggio. Il suo colore non cambia a seconda della colorazione del piumaggio.

**Zampe:** gambe di lunghezza media, potenti, evidenti, privi di piume; tarsi di colore bruno scuro nei soggetti giovani, variabile da rosa a carnicino negli adulti. Unghie più chiare.

**Cosce:** muscolose e ben sporgenti.

**Ventre:** poco sviluppato.

**Pelle:** morbida e bianca.

**Struttura Piumaggio:** Ben serrato al corpo. Piumaggio duro con penne larghe aderenti.

**Colorazione Piumaggio:**

Petto, collo, spalle, groppa: di colore nero brillante con riflessi bronzai intensi. Le penne che ricoprono le spalle e quelle laterali del petto hanno un'orlatura di colore nero intenso nei maschi, che nelle femmine può essere bruno scuro.

Tutte le penne delle spalle e del dorso fino alla coda devono presentare una fascia bronzata .

Ali: ornate da una larga fascia trasversale verde metallo oliva bronzata e terminano con una fascia nero brillante. La colorazione di base delle remiganti è marrone attraversata da barre chiare (tendenti al bianco). Il colore delle copritrici delle ali è bruno-nero brillante con una fine orlatura più chiara.

Coda: penne molto larghe, di colore bruno nero con fasce nere e nella parte distale terminano con una barratura larga uno-due centimetri seguita da una striscia da grigio scuro a bruno.

Gambe: Le penne sono nere e hanno una placca bronzata verso l'estremità larga uno-due centimetri, nel maschio terminano con una orlatura nera, mentre nella femmina è di colore bruno.

Piumino: scuro.

Tarsi: nei soggetti giovani la colorazione dei tarsi è bruno scuro mentre nei soggetti adulti varia da rosa a carnicino a bruno scuro.

**CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- assenza della protuberanza nasale carnosa in entrambi i sessi;
- assenza del ciuffo/pennello sul petto;
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.);
- assenza della brillantezza bronzata;
- penne delle ali senza barratura;
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

### **3. BRONZATO DEI COLLI EUGANEI (standard non disponibile)**

### **4. CASTANO PRECOCE**

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Castano d'Italia.

**AREA DI ORIGINE:** Regione Veneto.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** razza con elevata rusticità e spiccata attitudine alla cova nelle femmine. Buona qualità della carne.

**DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio del maschio alla maturità:** 12,0-14,0 kg.

**Peso medio della femmina alla maturità:** 5,0–7,0 kg.

**Uovo:** Peso medio 70-85 grammi. Colorazione guscio: leggermente rosato. Tasso di deposizione: n.d. **Misura Anello:** Maschio 24 mm, Femmina 22 mm.

**CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** allungato, forte, largo, si restringe verso la groppa.

**Testa:** caratteristica per le caruncole, per un'escrescenza carnosa sopra il becco ed una membrana sotto la gola. E' nuda nel maschio, leggermente impiumata nella femmina.

**Becco:** lungo e forte, leggermente ricurvo;

**Occhi:** brillanti; grandi; iride scura.

**Faccia:** nuda, rosso bluastro.

**Verruche:** sono presenti su tutta la faccia, sulle parti non impiumate del collo e sono di colore rosso. Sul becco si trova una protuberanza di carne pendente in avanti che nei momenti di eccitazione si allunga maggiormente nel maschio rispetto alla femmina. Nella tacchina la parte carunculosa del collo è meno sviluppata.

**Collo:** di lunghezza media; leggermente arcuato; parte superiore guarnita di caruncole di colore bluastro che diventano rosse quando l'animale è eccitato.

**Spalle:** molto larghe.

**Dorso:** Lungo, largo davanti, leggermente convesso ed inclinato verso la groppa.

**Ali:** lunghe; larghe; portate ben chiuse ed aderenti.

**Coda:** lunga; larga, portata chiusa ed inclinata a seguire la linea del dorso quando è a riposo, aperta a ventaglio quando il soggetto è eccitato.

**Petto:** molto largo, pieno, ben arrotondato, portato mediamente alto. La parte superiore del petto è caratterizzata da un ornamento centrale costituito da un insieme di setole nere che formano un "ciuffo" lungo anche 15 cm. nei maschi. Spesso, nei soggetti giovani, è nascosto dal piumaggio. Il suo colore non cambia a seconda della colorazione del piumaggio.

**Zampe:** gambe di lunghezza media, potenti, evidenti, privi di piume, tarsi chiari.

**Cosce:** muscolose e ben sporgenti.

**Pigmentazione:** molto intensa.

**Ventre:** poco sviluppato.

**Pelle:** morbida e bianca.

**Struttura Piumaggio:** Ben serrato al corpo. Piumaggio duro con penne larghe. Il maschio ha un ciuffo di setole rigide sul petto che deve essere il più lungo possibile, è tollerato un ciuffo corto nei soggetti molto vecchi.

**Colorazione Piumaggio:** Nei due sessi il colore di fondo ha una tonalità rosso castagna uniforme. Piumino bruno. E' tollerata la presenza di disegno bianco nelle ali.

#### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- assenza della protuberanza nasale in entrambi i sessi;
- piumaggio molle;
- assenza del ciuffo sul petto;
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.);
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica;
- emiganti e timoniere di colore bianco.

## **5. ERMELLINATO DI ROVIGO**

**AREA DI ORIGINE:** Regione Veneto.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** Tacchino rustico di taglia media, precoce e a rapido impennamento. Ottimo pascolatore, si presta molto bene all'allevamento all'aperto anche in zone montane.

#### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio del maschio alla maturità:** 9,0-10,0 kg.

**Peso medio della femmina alla maturità:** 4,0-6,0 kg.

**Uovo:** Peso medio 70-80 grammi. Colorazione guscio: punteggiatura bruno marrone su sfondo avorio.

#### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** allungato, forte, largo, si restringe verso la groppa.

**Testa:** cute nuda ricoperta di caruncole e verruche di colore rosso più o meno intenso e di diversa grandezza. Appeso alla gola è presente un unico bargiglio di colore rosso pallido e molto sviluppato. Dalla fronte pende una protuberanza carnosa, molto sviluppata nel maschio, la cui lunghezza è variabile in base allo stato di eccitazione.

**Becco:** lungo e forte; leggermente ricurvo; color corno.

**Occhi:** brillanti; grandi; iride scura.

**Faccia:** nuda, rosso bluastra.

**Verruche:** sono presenti su tutta la faccia, sulle parti non impiumate del collo e sono di colore rosso.

**Collo:** di lunghezza media; leggermente arcuato; parte superiore guarnita di caruncole di colore bluastrò che diventano rosse quando l'animale è eccitato.

**Spalle:** molto larghe.

**Dorso:** lungo, largo davanti, leggermente convesso ed inclinato verso la groppa.

**Ali:** lunghe; larghe; portate ben chiuse ed aderenti.

**Coda:** lunga; larga, portata chiusa ed inclinata a seguire la linea del dorso quando è a riposo, aperta a ventaglio quando il soggetto è eccitato.

**Petto:** molto largo, pieno, ben arrotondato, portato mediamente alto. La parte superiore del petto è caratterizzata da un ornamento centrale costituito da un insieme di setole nere che formano un "ciuffo" o "pennello" lungo anche 15 cm. nei maschi. Spesso, nei soggetti giovani, è nascosto dal piumaggio. Il colore del pennello non cambia a seconda della colorazione del piumaggio.

**Zampe:** Gambe di lunghezza media, potenti, evidenti, privi di piume; tarsi possibilmente molto lunghi, forti, quattro dita di colore carnicino. Presenza di speroni nei maschi.

**Cosce:** muscolose e ben sporgenti.

**Ventre:** poco sviluppato.

**Pelle:** morbida e bianca.

**Struttura Piumaggio:** Ben serrato al corpo. Piumaggio aderente con penne larghe.

**Colorazione Piumaggio:**

Mantello bianco con barratura nera (ermellinato). Ogni penna ha una fascia trasversale nera ed è orlata con un bordo di circa due centimetri di colore bianco. Il dorso, le copritrici della coda ed i fianchi hanno un disegno più pronunciato. Il petto ha un disegno a scaglie. Le penne della coda hanno lo stesso disegno delle altre ma con l'orlatura bianca molto più larga. Le remiganti primarie sono grigio nere con rachide bianca, le secondarie bianche con la parte terminale delle barbe esterne nera. Nella femmina il disegno è uguale ma molto meno marcato.

#### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- assenza della protuberanza carnosa in entrambi i sessi;
- assenza del ciuffo /pennello sul petto;
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.) colorazione
- marcatamente diversa da quella tipica;
- presenza di barratura con sfumatura marrone;
- barrature nere poco evidenti.

## **6. ROMAGNOLO**

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Tacchino di Romagna

**AREA DI ORIGINE:** Regione Emilia Romagna

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** razza di taglia minore rispetto alle altre razze locali con piumaggio uniforme e pelle giallastra.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio del maschio alla maturità:** 4-7 kg.

**Peso medio della femmina alla maturità:** 4-6 kg.

**Uovo:** Peso minimo n.d. - Colorazione guscio: n.d. - Tasso di deposizione: n.d.

**Misura Anello:** Maschio n.d. mm, Femmina n.d. mm.

### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** cilindrico, leggermente inclinato verso la groppa.

**Testa:** di medio piccola grandezza.

**Becco:** piuttosto corto ma forte e leggermente curvo di colore corno.

**Occhi:** grandi, molto vivaci. Da bruno scuro a nero con pupilla prominente.

**Faccia:** caruncole di medio sviluppo, coralli con granulazioni piuttosto fine, di colore rosso tendente al bluastro o al bianco a seconda del grado di eccitazione.

**Collo:** di lunghezza media ed arcuato. Presenta caruncole nella parte craniale; nella parte ventro-craniale è presente una larga giogaia di pelle nuda maggiormente sviluppata nel maschio.

**Spalle:** larghe e ben arrotondate.

**Dorso:** lungo, largo, convesso ed inclinato verso la groppa.

**Ali:** ben aderenti e portate chiuse.

**Coda:** grande con attaccatura larga portata ben aperta a ventaglio quando il soggetto è eccitato.

**Petto:** largo e profondo. Muscolatura ben evidente.

**Zampe:** piuttosto corte, generalmente con quattro dita. I tarsi si presentano chiari e di un rosa acceso nel periodo riproduttivo.

**Ventre:** poco sviluppato.

**Pelle:** morbida, sottile, giallo acceso, a volte giallo pallido paglierino. *Pulcini:* con piumino uniforme o screziato o striato.

**Struttura Piumaggio:** n.d.

**Colorazione Piumaggio:** Sono ammesse diverse colorazioni che in parte potrebbero renderlo simile ad altre razze autoctone nel nostro Paese. Tuttavia, la mole degli animali, particolarmente ridotta e la particolare pigmentazione della pelle risultano i migliori parametri per una distinzione netta di questa popolazione.

Le colorazioni sono:

- Bianco picchiettato di nero (sotto forma di screziatura o di disegno classico ermellinato);
- Bianco picchiettato di rosso;

- Bronzato ad ali nere;
- Grigiastro (perniciato argento a maglie nere);
- Variopinto (combinazione di toni neri, rossi e bianchi) il cosiddetto calico screziato con aree di piumaggio simili a quelle del pavone, ossia con iridescenze cangianti;
- Rosso uniforme (colore rosso uniforme e sostenuto su tutto il corpo);
- Nero sbiadito (colore nero inchiostro privo di particolare iridescenza).

In ragione delle livree presenti generalmente le remiganti primarie e secondarie delle ali sono prive del classico disegno a strisce alterne dette barrature. Non essendo la popolazione selezionata per colorazione spesso i colori possono mancare di uniformità.

### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- assenza della protuberanza nasale in entrambi i sessi;
- piumaggio molle;
- assenza del ciuffo sul petto;
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.);
- la barratura nelle ali non è ammessa.

## **7. NERO D'ITALIA (standard non disponibile)**

## **8. TACCHINO DI PARMA E PIACENZA**

**AREA DI ORIGINE:** Regione Emilia Romagna.

**TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:** razza di taglia maggiore rispetto alle altre razze locali con piumaggio per lo più grigiastro, privo dei riflessi cangianti e carne bianca.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio del maschio alla maturità:** 12,0 kg.

**Peso medio della femmina alla maturità:** 6,5 kg.

**Uovo:** Peso minimo n.d.. Colorazione guscio: n.d. Tasso di deposizione: n.d. **Misura Anello:** Maschio n.d mm, Femmina n.d mm.

### **CARATTERI TIPICI:**

**Tronco:** cilindrico, leggermente inclinato verso la groppa.

**Testa:** di media grandezza.

**Becco:** piuttosto corto ma forte e leggermente curvo di colore corno.

**Occhi:** grandi, molto vivaci. Da bruno scuro a nero con pupilla prominente.

**Faccia:** caruncole di medio sviluppo, coralli con granulazione piuttosto fine, di colore rosso tendente al bluastro o al bianco a seconda del grado di eccitazione.

**Collo:** di lunghezza media ed arcuato. Presenta caruncole nella parte craniale; nella parte ventro-craniale è presente una larga giogaia di pelle nuda maggiormente sviluppata nel maschio.

**Spalle:** larghe e ben arrotondate.

**Dorso:** lungo, largo, convesso ed inclinato verso la groppa.

**Ali:** ben aderenti portate chiuse.

**Coda:** grande con attaccatura larga portata ben aperta a ventaglio quando il soggetto è eccitato.

**Petto:** largo e profondo.

**Zampe:** piuttosto corte, generalmente con quattro dita. Tarsi di colore chiaro.

**Ventre:** poco sviluppato.

**Pelle:** morbida, sottile, biancastra, a volte giallo pallido.

**Struttura Piumaggio:** n.d

**Colorazione Piumaggio:** Nel collo, parte delle penne non in vista nera, la superficie in vista di ogni penna grigio acciaio che si avvicina al bianco e termina con una stretta banda nera che aumenta in larghezza avvicinandosi al dorso. Il dorso è nero metallico intenso assolutamente senza tracce di riflessi bronzee; sella nera, ogni penna termina con una larga banda grigio acciaio che si avvicina al bianco, la banda chiara aumenta in larghezza avvicinandosi alle copritrici della coda. Spalle e piccole copritrici grigio acciaio chiaro, che terminano con una stretta banda nera; le grandi copritrici grigio acciaio chiaro con alla fine una netta banda nera; ad ala chiusa si forma una larga banda attraverso l'ala che, come un nastro, le separa dalle remiganti secondarie. Tutte le remiganti primarie, in tutta la loro lunghezza, sono disegnate con nette barre parallele alternativamente nere e bianche di uguale larghezza. Anche nelle remiganti secondarie presentano nette barre parallele, bianche e nere, che si alternano; nelle penne più alte e più corte la barra nera prende riflessi grigio acciaio chiaro e la barra bianca diventa meno netta (esistono soggetti con remiganti a barratura imprecisa o con ala nera). Nella coda, le timoniere, le grandi e piccole copritrici sono nero opaco, ogni penna regolarmente disegnata con linee parallele marrone rossiccio, vicino alla fine della penna una larga banda nero metallico, assolutamente senza sfumature bronzee termina in una larga orlatura grigio acciaio che si avvicina al bianco. Nel petto, la superficie del piumaggio non in vista è nera, ogni penna termina con una larga banda grigio argento chiaro che diventa più scuro verso il ventre; alla gola ogni penna termina con una netta, stretta banda nera e si allarga gradatamente scendendo verso il basso. Parte dietro le cosce nero opaco, ogni penna termina con una netta banda bianca. Ventre nero che termina con bianco. Le cosce sono di colore nero intenso con orlo grigio acciaio; i tarsi e le dita nei soggetti maturi sono color salmone intenso; nei soggetti giovani sono scuri tendenti al salmone. Il piumino è color ardesia molto scuro. Nella femmina il piumaggio è uguale a quello del maschio in tutte le parti eccetto che sul dorso, dove l'orlatura nera finirà in corrispondenza della mantellina; da lì le penne dovrebbero iniziare a terminare con un netto orlo bianco di larghezza media. L'orlatura del petto cambia gradatamente verso il bianco e gradualmente, verso il ventre, si allarga.

**Pulcini:** piumino bruno variegato, tendenzialmente più chiaro rispetto al pulcino bronzato.

#### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- assenza della protuberanza nasale in entrambi i sessi;
- piumaggio molle;



- assenza del ciuffo sul petto;
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.);
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica;
- calamo delle penne bianco;
- barratura delle remiganti;
- piumino chiaro.

## Specie Colombo: (Columba livia)

1. ASCOLANO;
2. BERGAMASCO (STANDARD NON DISPONIBILE)
3. PIACENTINO;
4. REGGIANINO;
5. ROMAGNOLO;
6. ROMANO (STANDARD NON DISPONIBILE);
7. SOTTOBANCA MODENESE;
8. TRIGANINO MODENESE;

### 1. ASCOLANO

**AREA DI ORIGINE:** Italia Centrale, Emilia Romagna e Campania.

**TIPO E CONFORMAZIONE:** razza di taglia molto grande, con petto ampio, corpo di media lunghezza, portamento inclinato verso il basso, piumaggio ricco, ampio, non troppo attillato; le zampe sono dotate di pantofole e speroni.

#### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio maschio alla maturità:** 0,8-0,9 kg.

**Peso medio femmina alla maturità:** 0,8-0,9 kg.

**Misura Anello:** Maschio e Femmina 13 mm.

#### **CARATTERI TIPICI:**

**Testa:** di media grandezza, liscia, arrotondata, con fronte lievemente ascendente e nuca piuttosto piena.

**Becco:** robusto, di media lunghezza. Di colore scuro nei soggetti neri, chiaro nei soggetti bianchi e di qualsiasi colore nei soggetti pezzati e tigrati. Caruncole nasali poco sviluppate.

**Occhi:** iride rosso-arancio ad eccezione dei soggetti di colore bianco che hanno iride scura. Nei soggetti pezzati è ammesso iride scuro o arancio. Contorni poco sviluppati di colore variabile in relazione a quello del mantello.

**Collo:** di media lunghezza, robusto, molto ampio alla base, si restringe leggermente salendo verso la testa.

**Dorso:** di lunghezza leggermente superiore alla media, molto largo all'altezza delle spalle, si restringe leggermente verso la coda con la quale forma una linea ininterrotta, inclinata verso il basso.

**Petto:** molto ampio, arrotondato, non troppo prominente.

**Ali:** robuste, con scudo alare ampio, portate non troppo aderenti al corpo tanto da lasciare intravedere il dorso. Le estremità delle remiganti sono adagiate sopra la coda senza incrociarsi, terminando a circa quattro centimetri dalla estremità di essa.

**Coda:** leggermente più lunga della media, portata inclinata lungo il prolungamento della linea del dorso.

**Zampe:** di lunghezza media, forti; tarsi muniti di pantofole di media lunghezza e di speroni.

**Struttura Piumaggio:** ben sviluppato, formato da piume larghe, soffici, leggermente allentate.

## **COLORAZIONE PIUMAGGIO**

Le Livree sono Nera, bianca, tigrata e pezzata nera;

### **Disegno e colore:**

- livrea nera - la tonalità del colore deve essere uniforme ed intensa, con collo ricco di riflessi verde scarabeo;
- livrea tigrata - le remiganti primarie e la coda di colore scuro e corpo con disegno bianco, più o meno fitto, su fondo scuro;
- livrea pezzata nera - il piumaggio è suddiviso in parti nere e bianche di estensione più o meno equivalenti.

## **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- conformazione del corpo piccola, minuta, con petto troppo pieno e prominente, sterno deviato, di portamento orizzontale;
- testa e becco esili, fronte troppo prominente;
- collo stretto;
- dorso corto e stretto;
- coda corta;
- ali strette;
- piumaggio fine, poco sviluppato, troppo aderente al corpo;
- zampe sottili, dotate di scarso piumaggio, senza speroni;
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.);
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

## **2. BERGAMASCO (standard non disponibile)**

## **3. PIACENTINO**

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Pitone piacentino, Piton, Mondano piacentino.

**AREA DI ORIGINE:** Regione Emilia Romagna.

**TIPO E CONFORMAZIONE:** razza di grossa taglia e portamento maestoso. Discreto riproduttore e mediocre allevatore della prole. Colombo poco vivace consigliato per l'allevamento all'aperto.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio maschio alla maturità:** 0,800 kg.

**Peso medio femmina alla maturità:** 0,750 kg.

**Misura Anello:** Maschio e Femmina 11 mm.

### **CARATTERI TIPICI:**

**Testa:** di grandezza proporzionata al corpo, liscia, convessa, ben arrotondata nella parte posteriore e superiore, con fronte sfuggente che, vista di profilo deve risultare il più possibile sulla stessa linea del becco, senza interruzioni o appiattimenti.

**Becco:** di media lunghezza piuttosto forte di colore rosa carnicino nei soggetti bianchi, corno chiaro nei gialli e nei rossi, il più scuro possibile nei neri. Caruncole nasali bianche, lisce, ben estese ma non troppo pronunciate.

**Occhi:** Iride di colore nero (occhio di vecchia) nel mantello bianco, mentre negli altri mantelli l'iride è di colore rosso arancio (occhio di gallo). Contorno dell'occhio piuttosto largo e ben pronunciato, leggermente a forma di mandorla, che spicca sui mantelli per il suo colore rosso vivo (rosso cardinale); tale colore non deve mai tendere alla tonalità violacea o al rosso vinato.

**Collo:** di media lunghezza, robusto, ben pieno e largo all'attaccatura con il petto, si assottiglia leggermente salendo verso la testa.

**Dorso:** portato orizzontale, largo ed arrotondato, piuttosto corto, ben proporzionato.

**Petto:** ampio, arrotondato, prominente; sterno consistente e spesso, profondo ma non visibile, non negativamente caratterizzato da deviazioni.

**Ali:** scudi alari ampi ben aderenti e ricoprenti il dorso. Le remiganti portate chiuse ed adagiate sopra la coda, sono leggermente più corte di essa e terminano a tre o quattro centimetri dalla sua estremità.

**Coda:** composta da dodici timoniere, di media lunghezza, ben chiusa, portata orizzontale, a volte tendente leggermente verso l'alto, oltrepassa di poco l'estremità delle remiganti.

**Zampe:** robuste, con tarsi forti e nudi, di media lunghezza, dello stesso colore rosso vivo del contorno degli occhi; dita ben distanziate tra loro, proporzionate ai tarsi con unghie dello stesso colore del becco.

**Struttura Piumaggio:** folto, aderente, morbido, lucido.

### **COLORAZIONE PIUMAGGIO**

Le Livree sono bianca, nera, rossa, gialla.

### **Disegno e colore:**

- Livrea Bianca: deve essere perfettamente bianco candido, puro, uniforme, facendo risaltare magnificamente il rosso vivo del contorno degli occhi e delle gambe, esaltando il corpo del colombo, su un piumaggio morbido, lucido, aderente.
- Livrea Nera: colore uniforme, intenso, lucido, con riflessi brillanti su tutta la superficie; il collo e la parte superiore del petto devono presentare riflessi metallici, brillanti, verdastri; non

sono ammesse alterazioni di colore di nessun genere, il sottopiuma deve essere colorato il più possibile intensamente di nero.

- Livrea Rossa: color mattone vivace, ricorda il mantello rosso dei puledri, ha tonalità brillante, uniforme ed omogenea; sono da evitare mantelli opachi, piombati, soprattutto sull'addome, sulla coda e sul groppone; il sottopiuma sarà il più possibile rosso.
- Livrea Gialla: deve essere di un giallo puro, colore caldo ed espressivo, con tonalità uniforme e brillante (simile al tuorlo dell'uovo); il sottopiuma sarà il più possibile giallo.

#### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO**

- Corpo leggero, minuto, troppo stretto, troppo lungo, sbilanciato in avanti;
- petto stretto; dorso piatto, troppo lungo, inclinato verso il basso, portamento inclinato, posizione bassa;
- ali portate basse, a coltello, dorso scoperto;
- appiattimenti o interruzioni nella linea del profilo della testa, caruncole troppo sviluppate, contorno dell'occhio troppo stretto, di tonalità violacea o vinata, oppure di un colore rosso troppo pallido;
- stessi difetti di colore per quanto riguarda le gambe;
- tarsi piumati, sfumature di colore diverso dal mantello;
- becco macchiato nei soggetti bianchi, rossi e gialli;
- piumaggio scomposto;
- unghie di colore diverso da quello del becco;
- occhio scuro nei soggetti colorati;
- iride color perla;
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.);
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica;
- per i soggetti colorati saranno considerati difetti mantelli non lucidi, opachi, carbonati, macchiati,
- farfallati, il sotto piuma bianco o di qualsiasi altro colore, accenno di verghe.

## **4. REGGIANINO**

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Cravattato Italiano.

**AREA DI ORIGINE:** Regione Emilia Romagna.

**TIPO E CONFORMAZIONE:** razza di piccola taglia, vivace, pur essendo di indole domestica; ha portamento aggraziato e gentile, testa spigolosa, collo fornito di cravatta ben sviluppata, corpo corto e portato orizzontale, petto e dorso proporzionalmente larghi; ha tendenza a stare sulle punte dei piedi e risulta relativamente alto sui tarsi in confronto alle altre razze di cravattati.

#### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso medio maschio alla maturità:** 0,3-0,350 kg.

**Peso medio femmina alla maturità:** 0,3-0,350 kg.

**Misura Anello:** Maschio e Femmina 7 mm.

#### **CARATTERI TIPICI:**

**Testa:** piuttosto corta e larga, spigolosa, vista di profilo risulta di forma squadrata poiché è appiattita nella sua parte superiore, mentre sia la fronte che la parte posteriore cadono verso il basso; la fronte, piuttosto larga, deve essere ascendente e formare con l'attaccatura del becco un angolo piatto.

**Becco:** corto, ampio alla base, lungo quanto largo, diritto, rivolto verso il basso, si stacca dalla parte frontale della testa formando un angolo piatto con la fronte. E di vario colore in relazione al colore del piumaggio, sempre nero nei Rondoni. L'attaccatura delle piume della gola al becco deve essere il più possibile vicina alla estremità inferiore di esso. Caruncole nasali poco sviluppate, di colore bianco.

**Occhi:** sporgenti, piuttosto grandi, vivaci; iride di colore rosso arancio più o meno intenso, scura solo nei soggetti con mantello bianco; contorno dell'occhio di medio spessore, tollerato leggermente più sviluppato nei Rondoni, variante nel colore in relazione al mantello dal bianco carnicino al blu-grigio (nei Rondoni).

**Collo:** di media lunghezza, è portato fieramente, incurvato con eleganza, presenta posteriormente una leggera arcuatura nella parte superiore. Largo all'attaccatura con il petto, si restringe salendo verso la testa; la gola deve presentare una leggera giogaia ben distesa. La cravatta va dalla attaccatura del collo alla sommità della gola, con forte scriminatura di piume divergenti ed arruffate.

**Dorso:** largo e piano, portato orizzontale, corto.

**Petto:** ampio e ben arrotondato, portato alto e prominente rispetto alla spalla dell'ala;

**Ali:** spalla dell'ala tenuta staccata dal corpo, senza essere mai coperta dalle piume del petto; le ali devono ricoprire bene il dorso, forti, corte, raccolte e ben chiuse; remiganti corte e sottili, leggermente appoggiate sopra la coda, senza arrivare alla estremità di essa.

**Coda:** stretta, corta, portata orizzontale.

**Zampe:** piuttosto lunghe; tarsi implumi, sottili, di colore rosso; piedi piccoli, ben proporzionati; unghie del medesimo colore del becco.

**Struttura Piumaggio:** attillato, ben aderente al corpo e compatto.

## **COLORAZIONE PIUMAGGIO**

Le Livree sono: bianco, nero, pietra scura, bruno, rosso, giallo, blu con verghe nere, blu martellato di nero, blu argento con verghe scure (lattato) con e senza petto d'oro, blu argento martellato di scuro (Caprato) con o senza petto d'oro, rosso con verghe, rosso martellato, giallo con verghe (Pastellino), giallo martellato; zarzano nei colori nero, bruno, blu, rosso, giallo. I Rondoni sono considerati comunemente una sottorazza a parte, a causa delle loro caratteristiche strutturali e di mantello. Le varietà di Rondoni oggi allevate sono due: Rondone lattato (con verghe nere) e Rondone fagiano (con scaglie o martellatura, più o meno fitta, di colore nero). Esistono inoltre Reggianini di altri mantelli: Magnano, Sgurafosso, Argentino, Pietra Marmo, Pietra bianca, Solfanino, verosimilmente derivanti da incroci con altre razze, ma anche da accoppiamenti tra Reggianini di diverso mantello. In questi mantelli le caratteristiche della razza un po' meno perfezionate comportano al momento una tolleranza nel giudizio.

### **Disegno e colore:**

- Livree unicolori: le livree debbono essere di un colore il più possibile intenso ed uniforme.
- Livree con verghe e martellatura: le verghe devono essere regolari, continue e ben staccate tra loro, la martellatura più o meno fitta ma sempre regolare;
- Blu: tra tali soggetti sono preferiti quelli che presentano groppone pigmentato.
- Rosso e giallo con verghe: hanno scudo alare di tonalità delicata ed uniforme, su cui risaltano le verghe più intense, dello stesso colore del collo e del petto; la testa è preferibile più chiara del collo nei soggetti vergati, dello stesso colore del collo nei martellati.
- Blu argento con verghe scure (Lattati) e con martellatura scura (Caprati) con petto d'oro: la macchia dorata deve estendersi uniformemente a tutto il petto.
- Zarzani: devono avere brinatura bianca distribuita uniformemente sul mantello, con verghe possibilmente visibili.

- **Rondoni:** sono caratterizzati da un delicatissimo colore ghiaccio latteo che si estende su tutto il corpo in tenui sfumature, divenendo grigio piombo sulle remiganti; il collo deve avere lo stesso colore del corpo, senza far intravedere segni scuri dello stesso colore del sottopenna, mentre il groppone può essere bianco sfumato di azzurro. Il sottopenna dei Rondoni è color piombo scuro. Il Rondone lattato presenta sull'ala lattea due verghe nere nette, mentre la coda, un po' più azzurra dello scudo alare, porta una banda nera in prossimità del suo bordo. Anche la coda del Rondone fagiano porta una banda nera, mentre il suo scudo alare è caratterizzato da una martellatura nera, più o meno fitta, che peraltro lascia sempre intravedere le due verghe.

### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- portamento non orizzontale, posizione bassa sulle gambe, corpo troppo lungo,
- testa non squadrata, arrotondata;
- fronte troppo prominente o troppo stretta, fronte sfuggente, sulla stessa linea del becco, non angolata rispetto ad esso;
- becco troppo lungo, troppo stretto, troppo adunco;
- iride di colore perla o scura (tranne che nei soggetti bianchi);
- petto stretto, piatto, dorso stretto, inclinato;
- ali troppo lunghe, tenute basse, dorso scoperto;
- coda lunga, non orizzontale; cravatta scarsa o aperta;
- tarsi impiumati;
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.);
- colorazione e disegno marcatamente diversa da quella tipica.

## **5. ROMAGNOLO**

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Mondano Romagnolo.

**AREA DI ORIGINE:** Regione Emilia Romagna.

**TIPO E CONFORMAZIONE:** razza di grossa taglia, corto, dal tronco raccolto e solido, con petto largo, prominente e ben arrotondato e con portamento orizzontale o leggermente rialzato.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso minimo maschio alla maturità:** 0,850 kg.

**Peso minimo femmina alla maturità:** 0,750 kg.

**Misura Anello:** Maschio e Femmina 13 mm.

### **CARATTERI TIPICI:**

**Testa:** liscia, di media grandezza, ben arrotondata, in particolare nella sua parte frontale, formando con la calotta cranica e la nuca una linea continua, senza interruzioni o appiattimenti.

**Becco:** piuttosto sottile, diritto, di media lunghezza; è di colore nero nei soggetti a mantello nero, nei blu a verghe nere e nei blu martellati di nero, è di colore bruno nei soggetti a mantello rosso vergato e rosso martellato, rosa carnicino nei soggetti a mantello bianco. Nei soggetti lilla il colore del becco varia dal bruno al nero in relazione alla intensità del mantello, come pure varia in relazione al colore più o meno scuro del mantello il becco dei soggetti farfallati o pezzati.

**Occhi:** di media ampiezza, con iride di color arancio, nera nei soggetti bianchi. I contorni degli occhi sono molto stretti, e variano nel colore, da rosa carnicino a grigio, in relazione al mantello del soggetto.

**Collo:** largo e robusto all'attaccatura con il corpo, si assottiglia salendo verso la gola ben intagliata, contribuendo in tal modo all'eleganza del corpo.

**Dorso:** largo, proporzionalmente corto, orizzontale o leggermente rialzato.

**Petto:** Ampio, arrotondato, prominente, cosa che conferisce al colombo un aspetto pettoruto.

**Ali:** forti, con scudo alare ampio, portate aderenti al corpo e ricoprenti il dorso. Le remiganti devono adagiarsi sulla coda senza incrociarsi, terminando a 2 o 3 centimetri dalla estremità di questa.

**Coda:** chiusa, portata orizzontale o leggermente rialzata; essa non deve oltrepassare l'estremità delle remiganti primarie più di 2 o 3 centimetri.

**Zampe:** di media lunghezza, forti, con cosce e tarsi guarniti da lunghi speroni e da abbondanti e folte pantofole. Il piumaggio delle zampe, notevolmente sviluppato è composto da penne di 10/12 centimetri di lunghezza, con rachide dura; le penne devono essere orientate lateralmente.

**Struttura Piumaggio:** liscio e lucente, folto ma non troppo morbido, con copritrici larghe, non troppo lunghe, portate aderenti al corpo.

#### **COLORAZIONE PIUMAGGIO:**

Le Livree sono nera, bianca, lilla (grigio argento), rossa con verghe, blu con verghe nere, rosso martellato, blu martellato di nero, farfallata e pezzata.

#### **Disegno e colore:**

- Livrea Nera: colore intenso, lucido ed uniforme, il collo e la parte superiore del petto devono presentare riflessi verdastri brillanti.
- Livrea Bianco: mantello uniforme, senza alcuna traccia di colore e con piumaggio lucido.
- Livrea Lilla: colore grigio argento uniforme, molto delicato e tenue, mai comunque caratterizzato da tonalità troppo scure o con petto di colore diverso.
- Livrea Rossa con verghe: devono presentare scudo alare di tonalità chiara ed uniforme, con verghe di colore rosso più intenso, continue e ben delineate, mediamente larghe; petto e parte inferiore del collo sono dello stesso colore delle verghe, mentre la testa, la parte superiore del collo ed il ventre sono di colore grigio argenteo.
- Livrea Blu con verghe nere e blu martellata di nero: dorso il più possibile colorato con verghe che devono essere nitide e ben delineate, di media larghezza, senza macchie sullo scudo alare. Nei soggetti martellati disegno a martellatura il più possibile nitido ed uniforme, di colore intenso.
- Livrea Farfallata: devono evidenziare piume colorate singole o a chiazze (pezzati) distribuite uniformemente sul piumaggio di fondo che è di colore bianco.

#### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- conformazione del corpo piccola, minuta, con petto troppo pieno e prominente, sterno deviato, di portamento orizzontale;
- corpo troppo piccolo e leggero, troppo stretto, troppo lungo;
- testa spigolosa, collo corto, giogaia;

- iride di colore pallido o perla, contorni degli occhi troppo grossi, turgidi o comunque troppo visibili;
- becco troppo lungo, grosso o incurvato;
- petto stretto, portamento inclinato verso il basso, posizione sulle gambe troppo bassa;
- dorso scoperto, inclinato verso il basso;
- zampe eccessivamente lunghe o troppo corte;
- ali pendenti, a coltello, incrociate;
- coda troppo larga, troppo lunga, con timoniere a ventaglio; pantofole scarse, mancanza di speroni;
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.);
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica;
- accenno di verghe negli unicolori;
- verghe poco nitide o irregolari;
- martellatura non uniforme o poco nitida;
- sfumature o piume di colore diverso da quello di fondo negli unicolori;
- farfallatura non uniforme per tonalità o distribuzione;

## 6. ROMANO (standard non disponibile);

## 7. SOTTOBANCA MODENESE

**AREA DI ORIGINE:** Regione Emilia Romagna.

**TIPO E CONFORMAZIONE:** razza piuttosto alto sulle gambe, con portamento fiero, corpo orizzontale e coda leggermente rialzata.

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso minimo maschio alla maturità:** 0,850 kg.

**Peso minimo femmina alla maturità:** 0,800 kg.

**Misura Anello:** Maschio e Femmina 11 mm.

### **CARATTERI TIPICI:**

**Testa:** robusta, leggermente appiattita alla sommità, con fronte larga e moderatamente ascendente. Nei soggetti gialli caldani è tollerabile che la testa abbia caratteri leggermente più fini rispetto ai soggetti di altri colori. La parte posteriore della testa, la nuca, è ornata da un ciuffo a conchiglia folto e spesso, ben compatto, che la cinge sporgendo ai lati, ove forma due rosette all'altezza degli occhi e, abbassandosi sul collo, si conclude in una fluida criniera. Le rosette devono essere ben modellate, formate da diversi ordini di piume disposte concentricamente.

**Becco:** Moderatamente corto, robusto, tondeggiante e lievemente incurvato sulla punta. Il becco deve essere bianco roseo nei soggetti con mantello di colore bianco, giallo caldo, rosso, nero (Moro). I soggetti con mantello di colore magnano possono avere il becco con la punta di colore nero. La linea che unisce la fronte con il becco deve essere ininterrotta. Nei soggetti con mantello giallo caldo e rosso il becco è tollerato leggermente più minuto. Caruncole nasali di colore bianco, ben sviluppate, ma senza increspature (lisce).

**Occhi:** grandi e vivaci, con iride di colore rosso arancio (occhi "di gallo"); soltanto nei soggetti con mantello bianco l'occhio è completamente scuro (occhio "di vecchia" o "Al topo"). I contorni devono essere ben pronunciati e di colore rosso vivo.



**Collo:** robusto e slanciato, si assottiglia armoniosamente dalla attaccatura con il petto, dove deve essere largo fino alla gola, che deve presentarsi ben intagliata e svasata.

**Dorso:** largo, corto e robusto, portato il più possibile orizzontale, un poco incavato; spalle robuste e ben chiuse.

**Petto:** ampio, prominente, arrotondato. Lo sterno, profondo e di consistente spessore, raggiunge armoniosamente l'inizio della forchetta posteriore; fra il termine dello sterno e le due punte della forchetta non deve intercorrere troppo spazio.

**Ali:** robuste, con scudi alari ben aderenti al corpo e ricoprenti il dorso. Le remiganti primarie devono adagiarsi sopra la coda, la punta della penultima remigante deve arrestarsi a circa tre centimetri dalla estremità di essa.

**Coda:** chiusa e compatta, portata orizzontale o leggermente verso l'alto, è composta da un numero di timoniere variante tra 12 e 14.

**Zampe:** robuste, con tarsi grossi e nudi, abbastanza alti, portati lievemente inclinati e di colore rosso vivo più o meno carico, in relazione al colore del mantello. Dita ben piazzate, lunghe e robuste; unghie di colore roseo in tutti i mantelli, tranne che nei magnani i quali possono presentare unghie di qualsiasi colore.

**Struttura Piumaggio:** di qualunque colore sia il mantello del soggetto il suo piumaggio deve sempre essere lucido, morbido, ben aderente al corpo.

### **Colorazione Piumaggio:**

Livree: nero (moro), rosso (sauro), giallo (caldano), bianco e fondo ghiaccio granito (magnano).

### **Disegno e colore:**

Tutti gli unicolori devono avere colori uniformi e lucenti, dalla testa alla coda, senza macchie opache.

- Rosso (sauro) e giallo (caldano): sottopenna bianco; il colore del mantello dovrebbe preferibilmente mantenersi anche al centro delle rosette.
- Nero (moro): mantello di colore nero lucente.
- Bianco e fondo ghiaccio granito (magnano): mantello con colore di fondo bianco ghiaccio, ma non grigio opaco, con presenza di lievi soffusioni argentate alle estremità delle remiganti, con piume nere o parzialmente nere distribuite in maniera piuttosto uniforme su tutto il corpo. Il mantello magnano è mutevole, cambia con il progredire dell'età del soggetto: le piume nere tendono ad aumentare di numero e di intensità di colore, con il passare degli anni, ad ogni muta, in particolare sulla testa, sul collo e sul petto.

### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- conformazione del corpo piccola, minuta, con petto troppo pieno e prominente, sterno deviato, di portamento orizzontale;
- mancanza di proporzioni e di portamento, corpo leggero, troppo lungo, stretto;

- testa minuta, corta, arrotondata, fronte stretta, accentuata pinzatura o avvallamento tra fronte e attaccatura del becco;
- becco lungo, sottile, con attaccatura pinzata, portato verticale;
- occhio piccolo e infossato, sporgente, con iride color perla o depigmentato, occhio scuro nei mantelli colorati;
- contorno degli occhi stretto, di colore rosso scuro violaceo o troppo pallido e depigmentato;
- rosette asimmetriche, malformate o attaccate basse sul collo, ciuffo a conchiglia portato basso sul collo, storto, troppo aderente o appoggiato alla nuca, di scarso spessore;
- collo corto, sottile o a tubo;
- petto stretto, piatto, poco prominente;
- dorso stretto, portato inclinato verso il basso; scudi alari e spalle esili e strette, portate staccate dal petto o aperte; remiganti lunghe, a coltello, portate basse o incrociate sulla coda;
- coda aperta, lunga, portata bassa o inclinata verso il basso;
- zampe flesse, divaricate a x o storte, tarsi e piedi impiumati, di colore rosso violaceo;
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.);
- colorazione marcatamente diversa da quella tipica;
- colore del mantello non uniforme;
- mantello opaco;
- mantello arricciato;

## 8. TRIGANINO MODENESE

**AREA DI ORIGINE:** Regione Emilia Romagna.

**TIPO E CONFORMAZIONE:** razza antichissima dalla forma elegante e dal temperamento vivace; ha taglia ridotta, è corto, tondeggiante, snello sui tarsi alti, ben equilibrato tra testa e coda, entrambe come richiamate dalla verticale di appoggio; si muove con prontezza ed agilità, ha volo rapido e cangiante

### **DATI BIOMETRICI:**

**Peso minimo maschio alla maturità:** n.d kg.

**Peso minimo femmina alla maturità:** n.d kg.

**Misura Anello:** Maschio e Femmina 7 mm.

### **CARATTERI TIPICI:**

**Testa:** proporzionata al collo, liscia, leggermente convessa, con fronte moderatamente saliente e nuca piena.

**Becco:** di media robustezza, sempre più corto della testa; misurato superiormente, dalla base fino alla punta, ha lunghezza compresa tra i 16 ed i 18 millimetri. La punta della mascella superiore si incurva leggermente in basso. Può essere di colore bianco roseo, grigio corno, nero, in relazione al colore del mantello. Deve essere sempre bianco roseo nei Sauri e nei Caldani, mentre può essere bicolore nei Magnani. Caruncole nasali piatte, poco sviluppate.

**Occhi:** vivaci, con iride di un brillante color rosso arancio, più o meno vivo, in relazione al colore del mantello; contorni relativamente marcati e larghi, di colore carnicino chiaro.

**Collo:** pieno, portato verticalmente; il profilo posteriore è fortemente convesso nel terzo superiore, si fa concavo nel terzo medio e si affonda largo nel dorso nella parte inferiore; anteriormente si fonde con pienezza nel petto. La gola è ben delineata.

**Dorso:** non inclinato verso il basso, largo, corto ed affusolato.

**Petto:** largo, pieno, ben arrotondato; visto di profilo forma una linea ben arrotondata, senza interruzioni con l'addome.

**Ali:** piuttosto corte, l'ala chiusa deve misurare circa 21 cm. di lunghezza dalla curva della spalla alla punta delle remiganti; le due ali aperte, da una estremità all'altra misurano circa 60 cm. Gli scudi alari sono ampi; le ali sono portate ben aderenti al corpo e ricoprenti il dorso; le punte delle remiganti sono portate sopra la coda, senza mai raggiungere l'orlo della coda stessa.

**Coda:** corta, talvolta un poco larga ma compatta, portata leggermente inclinata verso l'alto, continua il profilo inferiore che, dall'addome alla coda, sfugge sempre più verso l'alto. La sua lunghezza è di circa 9 cm.

**Zampe:** piuttosto alte di posizione ed ardite nell'incedere; le gambe non devono essere tenute troppo diritte, ma risultano leggermente flesse all'articolazione del calcagno; da questa alla base del piede le zampe misurano circa 3 cm in lunghezza. Le cosce sono ben visibili, i tarsi, perfettamente nudi, hanno colore rosso vivo; il dito medio anteriore misura circa 3 cm, il posteriore circa 1,5 cm.

**Unghie del colore del becco:** soltanto nei Magnani le unghie possono essere di colore diverso da quello del becco

**Struttura Piumaggio:** ricco, aderente morbido e liscio; risulta particolarmente abbondante nella parte posteriore dell'addome e attorno all'ano, dove, essendo anche un po' allentato, fa assumere a questa parte del corpo un profilo tondeggianti e pieno.

## COLORAZIONE PIUMAGGIO

La razza è suddivisa in due grandi gruppi principali: *Schietti e Gazzi*.

- **Schietto:** "sciét", in dialetto modenese, significa non mischiato, puro, in riferimento al colore del mantello. Lo Schietto ha corpo totalmente colorato; è generalmente più piccolo del Gazzo;
- **Gazzo:** è così detto per la somiglianza del suo disegno con quello della Gazza (Pica). Ha corpo bianco, con testa, ali, coda e sottocoda pigmentati. La linea di demarcazione della parte colorata, sulla nuca, dovrebbe arrivare all'altezza del contorno inferiore dell'occhio. Il Gazzo è generalmente un poco più grosso dello Schietto.

I mantelli della razza si possono dividere nelle seguenti categorie:

- **Unicolori:** nell'ambito della sua distribuzione il colore è uniformemente uguale.
- **Vergati:** lo scudo alare presenta due verghe, ben delineate, di colore vario ma sempre diverso dalla tinta di fondo dello scudo.
- **Variopinti:** lo scudo alare presenta disegni di forma diversa e di diverso colore sulla tinta di fondo: a spalla, trigano, rospato, quadrinato, fioccato e puntato. Un colombo nero variopinto di rosso; secondo il disegno rosso dello scudo alare, si può definire nei seguenti modi:
- Nero a spalla rossa: se il disegno rosso si estende a tutto o a buona parte dello scudo alare, nascondendo il colore di fondo.
- Nero Trigano di Rosso: se il disegno sullo scudo alare è a macchie triangolari rosse, più frequenti sulle copritrici.
- Nero Rospato: simile al mantello precedente con, in più, evidenti verghe nere sul colore di fondo.

- **Nero Quadrinato di rosso:** le macchie rosse del disegno sono più grandi di quelle del Triganino di rosso.
- **Nero fioccato di rosso:** se porta sulle copritrici piccole macchie rosse non di forma triangolare.
- **Nero puntato di rosso:** se porta sulle copritrici dei semplici puntini o graffiature di colore rosso.
- **Frizzati:** presentano lievi segni, di svariati colori, specialmente sulle remiganti e sulla coda (simili ad un segno tracciato con la matita). La frizzatura si presenta tanto sui vergati che sui variopinti.
- **Magnani:** il mantello ha colore di fondo chiaro con o senza verghe sullo scudo alare. Tutte le penne delle parti colorate devono essere macchiate e possono esserlo in tutte le tinte della gamma del Triganino. In realtà, soltanto alcune decine di mantelli Magnani sono allevate con una certa frequenza. Per l'influenza di un particolare fattore cromatico ereditario, il colore del mantello si presenta scomposto nei suoi fattori di ammassamento, estensione, intensità e diluizione, con progressione cromatica nell'età, che si evolve in misura più intensa nei maschi che nelle femmine, su aree irregolari per dimensioni, forma ed intensità. Sono considerate di grande pregio macchie (dette comunemente "pezze") di varia forma ed estensione, di un colore più intenso o diverso da quello prevalente nella colorazione delle penne (molto pregiato il colombo che presenta la pezza su uno solo degli scudi alari o su ambedue ma di colore diverso).
- **Zarzanelli:** il pigmento, che può essere di qualsiasi colore, si manifesta soltanto sull'orlo della penna, per cui tutte le penne, chiare alla base, si colorano verso il bordo.

Le livree del Triganino sono:

- **Sauro:** rosso uniforme, simile al colore dei cavalli;
- **Caldano:** giallo carico, uniforme, simile al colore del tuorlo d'uovo;
- **Nero:** uniforme, carico e lucido;
- **Nero con verghe:** bianche, rosse o gialle;
- **Nero variopinto:** in tutti i disegni dei variopinti, nei medesimi colori delle verghe del nero vergato;
- **Nero rospato:** è un nero con disegno a macchie rosse sulle copritrici e sulle secondarie delle ali. Deve avere la verga nera;
- **Maltinto:** nero opaco uniforme;
- **Maltinto con verghe:** nere intense, bianche, rosse, gialle;
- **Maltinto variopinto:** in tutti i disegni dei variopinti, nei medesimi colori del Maltinto con verghe;
- **Bigio (blu) con verghe:** nere, bianche, rosse, gialle;
- **Bigio (blu) variopinto:** in tutti i disegni dei variopinti, nei medesimi colori delle verghe del bigio vergato;
- **Rosso:** color terracotta, a coda chiara con bordo piombo chiaro;
- **Schiavone:** (comunemente detto "sgia-vone") è rosso mattone. con coda grigiastra sfumata di rosso, con bordo nerastro o bianco. Non ha alcun pregio;
- **Covro:** così detto dal colore dell'uva covra; ha spalla color castagno o mogano. sul colore di fondo più scuro, con coda ed apice delle remiganti bigio scuro. L'orlo della coda è nero;
- **Triganino di covro:** presenta sulla spalla un disegno a macchie triangolari castagno o mogano, su colore di fondo grigio piombo scuro;
- **Dorato:** a spalla giallo oro su colore di fondo grigio terreo, con apice delle remiganti e orlo della coda grigio plumbeo;
- **Triganino di dorato:** presenta sulla spalla un disegno a macchie triangolari giallo oro, su colore di fondo grigio terreo; l'orlo della coda è grigio plumbeo;
- **Pietra rossa:** colore rosso molto carico, tendente al brunito, uniforme;

- **Pietra scura:** bruno oliva uniforme, più intenso sulle remiganti e sulle timoniere;
- **Pietra scura con verghe:** nere, bianche, rosse, gialle;
- **Pietra scura variopinto:** in tutti i disegni dei variopinti nei colori bianco, rosso, giallo;
- **Pietra chiara con verghe:** colore terreo molto chiaro (caffè latte); può avere verghe rosse, gialle o bianche; se ha la verga rossa la banda sulla coda è del colore delle verghe; se ha la verga gialla o bianca la testa e la coda sono color bigio chiaro, mentre la banda della coda è più scura;
- **Pietra chiara variopinto:** può essere trigano di bianco, di rosso o di giallo;
- **Monaro o mugnaio:** ha la testa e la parte anteriore del corpo color piombo lattata con sfumature vinate; lo scudo alare è azzurro-gnolo infarinato, le remiganti e le timoniere sono più sbiadite;
- **Monaro con verghe:** sulla tinta fondamentale si aggiungono le verghe rosse;
- **Monaro frizzato** (con o senza verghe rosse): ha spruzzature o macchiette nerastre o nere sparse su tutte le parti colorate;
- **Monaro sanguigno:** nella tinta fondamentale il rosso è più intenso;
- **Monaro del grano:** ha tinta prevalentemente piombo lattata o azzurrognola, con testa azzurrognola vinata, remiganti e timoniere più sbiadite. Può avere verghe bianche, rosse o gialle;
- **Biscione:** blu scuro a coda orlata di nero, con le copritrici delle ali sfumate di scuro sul bordo, il che dona all'ala l'apparenza delle squame di una biscia; può avere verghe bianche, nere, rosse, gialle;
- **Sgurafosso:** così detto perché ha colore simile al fango dei fossi; è di colore cenerino plumbeo più o meno scuro, uniforme o con fascia terminale della coda più scura. Ha sull'ala soffusioni rosee se il mantello presenta verghe gialle o rosse, mentre lo scudo alare è più cenerino se porta verghe bianche;
- **Sgurafosso con verghe:** bianche, rosse, gialle;
- **Sgurafosso variopinto:** trigano di bianco, di rosso o di giallo; questo mantello ed il precedente presentano, talvolta, frizzature di altro colore;
- **Brodoceci:** somiglia al colore dell'acqua in cui sono stati cotti i ceci; ha ali azzurrognole con sfumatura rossa, remiganti rossastre con punta scura e coda bigia orlata in rosso con fascia terminale più scura;
- **Pietra bianca:** giallo chiaro con verghe gialle di tinta più intensa; coda chiara con o senza bordo velato di giallo; può avere, raramente, frizzature di altro colore sulla spalla;
- **Pietra marmo:** color caffè latte chiarissimo (perla), a spalla leggermente squamata o puntata di giallo; assume la denominazione di Pietra marmo antica se la colorazione di fondo tende al Pietra scura, con verghe nere. Può presentare verghe gialle o anche spalla gialla;
- **Giuggiola:** color marrone rossiccio, il più uniforme possibile, della tinta dell'omonimo frutto; è conosciuto esclusivamente nei Magnani;
- **Persichino:** color rosa fior di pesco;
- **Cenerino:** color grigio cenere. Anche questi ultimi due mantelli sono conosciuti esclusivamente nella categoria dei Magnani;
- **Solfanino o Zolfanello:** bigio scuro plumbeo, mischiato a bianco, uniforme o anche frizzato di nero;
- **Solfanino con verghe:** rosse, gialle o bianche. con o senza frizzature nere;
- **Solfanino variopinto:** a spalla rossa o gialla, con o senza frizzature nere;
- **Rospo:** macchiato, con mescolanza, il più regolare possibile, di nero, di rosso e di bianco; risulta pertanto tricolore;
- **Varazzo:** tutte le penne del mantello, di colore nero, devono essere orlate di bianco;
- **Pennafurba:** ha spalla color giallo crema perlaceo, con verghe gialle; la striscia terminale della coda e la punta delle remiganti sono cenerine; sulla spalla e nella coda può presentare delle frizzature;

- **Smagliato:** color grigio terreo, con macchie a squame gialle sulle copritrici; ha verghe gialle e, talvolta, bianche; la coda è orlata di scuro;
- **Trigano di smagliato:** presenta sul mantello color grigio terreo macchie gialle più accentuate e più frequenti;
- **Uccello:** ha colore di fondo cenerino scuro, con spalla bianca, rossiccia o gialla, sulla quale ogni penna è orlata di grigio; le punte delle remiganti sono nere, la coda ha fascia terminale nera;
- **Bianco:** unicolore; non ha alcun valore.

#### **Disegno e colore:**

- **Gazzi:** disegno ben delineato, con contorni netti, senza sbavature;
- **Schietti unicolori:** devono avere tonalità uniforme su tutto il corpo.

Tutti i colori devono essere brillanti; i soggetti con verghe devono avere verghe ben delineate e relativamente larghe; i variopinti devono avere disegno a macchie il più possibile regolare e ben distribuito. Nei Magnani sono considerate di grande pregio macchie o "pezze" di varia forma ed estensione, di colore più intenso o, meglio, diverso da quello di fondo. È preferibile che la pezza sia localizzata su uno solo degli scudi alari, o su ambedue gli scudi, purché di colore diverso.

#### **CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO:**

- corpo di aspetto massiccio, troppo grosso, troppo lungo, troppo stretto;
- fronte troppo sfuggente;
- scudo alare stretto;
- petto e dorso insufficienti;
- dorso e coda portati bassi;
- zampe troppo corte, posizione troppo bassa;
- coda bipartita o troppo larga
- piumaggio secco e scarso;
- evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.)

#### **Difetti del disegno**

Un Triganino con un disegno corretto si definisce "legittimo"; la superficie pigmentata non deve presentare penne, o chiazze di penne, bianche e, viceversa, nelle zone bianche non devono presentarsi penne, o chiazze di penne, colorate; qualora ciò non accada il Triganino si definisce "illegittimo", cioè difettoso per quanto riguarda il disegno

- Brinato se ha piume bianche sulla testa colorata;
- dal fiocco se ha piume colorate sul collo bianco;
- intricato se ha piume colorate sul petto bianco;
- dalla barba se ha piume colorate su gola e/o collo;
- dalla frappa se ha piume bianche su petto colorato;
- dalla cappetta se ha piume bianche sulla spalla;
- codronato se ha piume colorate su dorso bianco;
- dai venti bianchi se ha remiganti o timoniere bianche;
- dalla braghetta se ha piume colorate sulle cosce;
- dal calzone se ha piume colorate sui metatarsi.

### **Difetti della colorazione**

- dal calzone se ha piume colorate sui metatarsi;
- vessillo vuoto di colore in prossimità della rachide;
- piume bianche sul dorso negli Schietti;
- colore sbiadito, sia uniformemente che a chiazze, negli unicolori Gazzi e Schietti (tale difetto si può riscontrare anche nel colore delle verghe e delle macchie che compongono il disegno alare dei variopinti).

### **Difetti della livrea**

- sono difetti propri di alcuni mantelli, per esempio l'orlatura scura nelle verghe dei soggetti Pietra chiara con verghe;
- i soggetti Gazzi Magnani hanno, assai frequentemente, mascherina insufficiente o mal delineata e occhio bicolore, o con iride macchiata di scuro; tali difetti, per i suddetti mantelli, sono solo scarsamente penalizzati nel giudizio se i soggetti che li presentano hanno caratteristiche di mantello e di colore molto rare e ricercate.